



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets

(11) Veröffentlichungsnummer:

0 230 274
A2

J1017 U.S. PTO
10/087756
03/04/02

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(21) Anmeldenummer: 87100460.2

(22) Anmeldetag: 15.01.87

(51) Int. Cl.: C 07 D 487/08, C 07 D 519/00,
C 07 D 471/08, C 07 D 498/08,
C 07 D 498/04, C 07 D 215/56,
A 61 K 31/53 // (C07D487/08,
241:00, 209:00), (C07D519/00,
487:00, 471:00), (C07D519/00,
498:00, 487:00), (C07D487/08,
209:00, 209:00), (C07D498/08,
307:00, 265:00), (C07D471/08,
221:00, 205:00)

(30) Priorität: 21.01.86 DE 3601567

(71) Anmelder: BAYER AG, Konzernverwaltung RP
Patentabteilung, D-5090 Leverkusen 1 Bayerwerk (DE)


(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung: 29.07.87
Patentblatt 87/31

(72) Erfinder: Petersen, Uwe, Dr., Auf dem Forst 4,
D-5090 Leverkusen 1 (DE)
Erfinder: Grohe, Klaus, Dr., Am Wasserturm 10,
D-5068 Odenthal (DE)
Erfinder: Schenke, Thomas, Dr., Morgengraben 5,
D-5000 Köln 80 (DE)
Erfinder: Hagemann, Hermann, Dr., Kandisky-Strasse 52,
D-5090 Leverkusen 1 (DE)
Erfinder: Zeiler, Hans-Joachim, Dr., Elsbecker
Strasse 46, D-5620 Velbert 15 (DE)
Erfinder: Metzger, Karl Georg, Dr., Pahlkestrasse 75,
D-5600 Wuppertal 1 (DE)

(84) Benannte Vertragsstaaten: AT BE CH DE ES FR GB GR
IT LI NL SE

(54) 7-(Azabicycloalkyl)-chinoloncarbonsäure- und -naphthyridoncarbonsäure-Derivate.

(57) Die Erfindung betrifft neue 7-(Azabicycloalkyl)-chinolon-
carbonsäure- und -naphthyridoncarbonsäure-Derivate der all-
gemeinen Formel (I)



BEST AVAILABLE COPY

in der R¹, R², R³, X¹ und A die in der Beschreibung angegebene
Bedeutung haben, Verfahren zu ihrer Herstellung sowie diese
enthaltende antibakterielle Mittel und Futterzusatzstoffe.

EP 0 230 274 A2

BAYER AKTIENGESELLSCHAFT
5 Konzernverwaltung RP
Patentabteilung

5090 Leverkusen, Bayerwerk
Ad/AB

10

7-(Azabicycloalkyl)-chinoloncarbonsäure- und -naphthyridoncarbonsäure-Derivate


15

Die vorliegende Erfindung betrifft neue 7-(Azabicycloalkyl)-chinoloncarbonsäure- und -naphthyridoncarbonsäure-Derivate, Verfahren zu ihrer Herstellung sowie diese enthaltende antibakterielle Mittel und Futterzusatzstoffe.

20


Es ist bereits bekanntgeworden, daß 1-Ethyl-6-fluor-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-3-chinolincarbonsäuren (Deutsche Patentanmeldungen 2 084 097 und 2 939 786),
25 1-Cyclopropyl-6-fluor-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-3-chinolincarbonsäuren (Europäische Patentanmeldung 49 355, Deutsche Patentanmeldung 3 142 854), 1-Cyclopropyl-6-fluor-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-1,8-naphthyridin-3-carbonsäuren (Japanische Patentanmeldung
30 60 032 790), 9-Fluor-2,3-dihydro-3-methyl-7-oxo-10-(1-piperazinyl)-7H-pyrido[1,2,3-de][1,4]benzoxacin-6-carbonsäuren (Europäische Patentanmeldung 47 005), 1-Aryl-6-fluor-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-3-chinolincarbonsäuren (Europäische Patentanmeldung 131 839) und
35 Azabicycloalkyl-chinoloncarbonsäuren (Europäische Patentanmeldung 159 174) antibakteriell wirksam sind.

Es wurde gefunden, daß die neuen 7-(Azabicycloalkyl)-
 5 chinoloncarbonsäure- beziehungsweise -naphthyridoncar-
 bonsäure-Derivate der Formel (I).



15 in welcher


- R¹ für Methyl, Ethyl, Propyl, Isopropyl, Cyclopropyl,
 Vinyl, 2-Hydroxyethyl, 2-Fluorethyl, Methoxy, Amino,
 Methylamino, Dimethylamino, Phenyl, 4-Fluorphenyl,
 2,4-Difluorphenyl,
- 20 R² für Wasserstoff, Alkyl mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen,
 (5-Methyl-2-oxo-1,3-dioxol-4-yl)-methyl,
- 25 R³ für einen Rest der Formel



in welcher

- Y für R⁴-N, O, S,
- 35

Z für $-(CH_2)_n-$, $-CH_2-O-CH_2-$, $-CH_2-S-CH_2-$, $-CH_2-S-$,




n für 1, 2 oder 3,

10 R^4 für Wasserstoff, gegebenenfalls durch Hydroxy substituiertes Alkyl, Alkenyl oder Alkynyl mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen, gegebenenfalls durch Nitro oder Amino substituiertes Benzyl, Oxoalkyl mit 2 bis 4 Kohlenstoffatomen oder (5-Methyl-2-oxo-1,3-dioxol-4-yl)-methyl,

R^5 für Wasserstoff oder Methyl steht,

20 X^1 für Fluor, Chlor oder Nitro und


A für N oder C- R^6 steht, worin R^6 für Wasserstoff, Fluor, Chlor, Methyl oder Nitro steht oder auch gemeinsam mit R^1 eine Brücke der Struktur



bilden kann,

30 mit der Maßgabe, daß für den Fall, daß X^1 für Fluor, R^2 für H und A für CF oder N stehen und R^1 für Ethyl, Cyclopropyl, Fluor-ethyl oder Vinyl steht oder R^6 mit R^1 eine Brücke der Struktur $-O-CH_2-CH-CH_3$ bildet, n ungleich 2 ist und R^3 nicht für den

35 Rest

5 R^4-N  stehen kann, sowie ausgenommen die Ver-


bindung 7-(2,5-Diazabicyclo[2,2,2]oct-2-yl)-1-ethyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-chinolincarbonsäure,

10 und deren pharmazeutisch verwendbaren Hydrate und Säureadditionssalze sowie die Alkali-, Erdalkali-, Silber- und Guanidiniumsalze der zugrundeliegenden Carbonsäuren eine hohe antibakterielle Wirkung insbesondere im grampositiven Bereich aufweisen.

15

Sie eignen sich daher als Wirkstoffe für die Human- und Veterinärmedizin, wobei zur Veterinärmedizin auch die Behandlung von Fischen zur Therapie oder Vorbeugung bakterieller Infektionen zu zählen ist.

20 Weiterer Gegenstand der Erfindung sind 7-(Azabicycloalkyl)-chinoloncarbonsäure- beziehungsweise -naphthyridoncarbonsäure-Derivate der Formel (I)



(I),


in welcher

25 R^1 für Methyl, Ethyl, Propyl, Isopropyl, Cyclopropyl, Vinyl, 2-Hydroxyethyl, 2-Fluorethyl, Methoxy, Amino, Methylamino, Dimethylamino, Phenyl, Fluorphenyl, 2,4-Difluorphenyl,

R^2 für Wasserstoff, Alkyl mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen, (5-Methyl-2-oxo-1,3-dioxol-4-yl)-methyl,

Le A 24 318


R^3 für einen im Ringsystem durch Hydroxy oder Methyl ein- oder mehrfach substituierten Rest der Formel



in welcher

Y für R^4-N , O, S,

5 Z für $-(CH_2)_n-$, $-CH_2-O-CH_2-$, $-CH_2-S-CH_2-$, $-CH_2-S-$,





n für 1, 2 oder 3,

10 R^4 für Wasserstoff, gegebenenfalls durch Hydroxy substituiertes Alkyl, Alkenyl oder Alkinyl mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen, gegebenenfalls durch Nitro oder Amino substituiertes Benzyl, Oxoalkyl mit 2 bis 4 Kohlenstoffatomen oder (5-Methyl-2-oxo-1,3-dioxol-4-yl)-methyl und

R^5 für Wasserstoff oder Methyl steht,

X^1 für Fluor, Chlor oder Nitro und

15 A für N oder C- R^6 steht, worin R^6 für Wasserstoff, Fluor, Chlor, Methyl oder Nitro steht oder auch gemeinsam mit R^1 eine Brücke der Struktur



bilden kann

und deren pharmazeutisch verwendbare Hydrate und Säure-additionssalze sowie die Alkali-, Erdalkali-, Silber- und Guanidiniumsalze der zugrundeliegenden Carbonsäuren.

- 5 Bevorzugt sind diejenigen Verbindungen der Formel (I), in denen

R^1 für Methyl, Ethyl, Cyclopropyl, 2-Hydroxyethyl, Vinyl, 2-Fluorethyl, Methoxy, Methylamino, Phenyl, 4-Fluorphenyl, 2,4-Difluorphenyl,

10 R^2 für Wasserstoff, Methyl, Ethyl,

R^3 für einen Rest der Formel



in welcher

5

Y für R^4 -N, O,

10

Z für $-(CH_2)_n-$, $-CH_2-O-CH_2-$, $-CH_2-\overset{\overset{R^5}{|}}{N}-CH_2-$,

n für 1, 2 oder 3,

15

R^4 für Wasserstoff, gegebenenfalls durch Hydroxy substituiertes Alkyl, Alkenyl oder Alkinyl mit 1 bis 3 Kohlenstoffatomen, gegebenenfalls durch Nitro oder Amino substituiertes Benzyl oder Oxoalkyl mit 2 bis 4 Kohlenstoffatomen und


20

R^5 für Wasserstoff oder Methyl steht,

X^1 für Fluor, Chlor oder Nitro und

25

A für N oder C- R^6 steht, worin R^6 für Wasserstoff, Fluor, Chlor, Methyl oder Nitro steht oder auch gemeinsam mit R^1 eine Brücke der Struktur




30

bilden kann,

35

mit der Maßgabe, daß für den Fall, daß X^1 für Fluor, R^2 für H und A für CF oder N stehen und R^1 für Ethyl, Cyclopropyl, Fluor-ethyl oder Vinyl steht oder R^6 mit R^1 eine Brücke der Struktur $-O-CH_2-\overset{\overset{|}{|}}{CH}-CH_3$ bildet, n ungleich 2 ist und R^3 nicht für den Rest

5 R^4-N  N- stehen kann, sowie ausgenommen die V r-

bindung 7-(2,5-Diazabicyclo[2.2.2]oct-2-yl)-1-ethyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-chinolincarbonsäure,

10 und deren pharmazeutisch verwendbaren Hydrate und Säure-additionssalze sowie die Alkali-, Erdalkali-, Silber- und Guanidiniumsalze der zugrundeliegenden Carbonsäuren.

15 Besonders bevorzugt sind diejenigen Verbindungen der Formel (I), in denen

20 R^1 für Ethyl, Cyclopropyl, 2-Fluorethyl, Vinyl, Methylamino, Phenyl, 4-Fluorphenyl, 2,4-Difluorphenyl,

R^2 für Wasserstoff, Methyl, Ethyl,

R^3 für einen Rest der Formel

25



30 in welcher


Y für R^4-N ,

Z für $-(CH_2)_n-$,

35

n für 1 oder 2,

- 5 R^4 für Wasserstoff, gegebenenfalls durch Hydroxy substituiertes Alkyl, Alkenyl oder Alkinyl mit 1 bis 3 Kohlenstoffatomen, gegebenenfalls durch Nitro oder Amino substituiertes Benzyl oder Oxoalkyl mit 2 bis 4 Kohlenstoffatomen und
- 10 R^5 für Wasserstoff oder Methyl steht,
- X^1 für Fluor, Chlor oder Nitro und
- 15 A für N oder C- R^6 steht, worin
 R^6 für Wasserstoff, Fluor, Chlor oder Nitro steht oder auch gemeinsam mit R^1 eine Brücke der Struktur
 $-O-CH_2-\underset{|}{CH}-CH_3$ oder $-CH_2-CH_2-\underset{|}{CH}-CH_3$
- 20 bilden kann,
- mit der Maßgabe, daß für den Fall, daß X^1 für Fluor, R^2 für H und A für CF oder N stehen und R^1 für Ethyl, Cyclopropyl, Fluorethyl oder Vinyl steht oder R^6 mit R^1 eine Brücke der Struktur
- 25 $-O-CH_2-\underset{|}{CH}-CH_3$ bildet, n ungleich 2 ist und R^3 nicht für den Rest

30 R^4-N  N- stehen kann, sowie ausgenommen die Ver-


bindung 7-(2,5-Diazabicyclo[2.2.2]oct-2-yl)-1-ethyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-chinolincarbonsäure,

35

- 5 und deren pharmazeutisch verwendbaren Hydrate und Säure-
additionssalze sowie die Alkali-, Erdalkali-, Silber- und
Guanidiniumsalze der zugrundeliegenden Carbonsäuren.

Bevorzugt sind auch diejenigen Verbindungen der Formel (I),
in denen

- 10 R^1 für Methyl, Ethyl, Cyclopropyl, 2-Hydroxyethyl,
Vinyl, 2-Fluorethyl, Methoxy, Methylamino, Phenyl,
4-Fluorphenyl, 2,4-Difluorphenyl,
 R^2 für Wasserstoff, Methyl, Ethyl,
 R^3 für einen ein- oder mehrfach, bevorzugt 2-fach,
durch Methyl substituierten Rest der Formel



- 15 in welcher

Y für R^4-N , O ,

Z für $-(CH_2)_n-$, $-CH_2-O-CH_2-$, $-CH_2-\overset{R^5}{\underset{|}{N}}-CH_2-$,

n für 1, 2 oder 3,


- 20 R^4 für Wasserstoff, gegebenenfalls durch Hydroxy substi-
tuiertes Alkyl, Alkenyl oder Alkinyll mit 1 bis 3 Koh-
lenstoffatomen, gegebenenfalls durch Nitro oder Amino
substituiertes Benzyl oder Oxoalkyl mit 2 bis 4 Koh-
lenstoffatomen und

R⁵ für Wasserstoff oder Methyl steht,

X¹ für Fluor, Chlor oder Nitro und

A für N oder C-R⁶ steht, worin

5 R⁶ für Wasserstoff, Fluor, Chlor, Methyl oder Nitro steht oder auch gemeinsam mit R¹ eine Brücke der Struktur



bilden kann,

10 mit der Maßgabe, daß für den Fall, daß X¹ für Fluor, R² für H und A für CF oder N stehen und R¹ für Ethyl, Cyclopropyl, Fluor-ethyl oder Vinyl steht oder R⁶ mit R¹ eine Brücke der Struktur -O-CH₂-CH-CH₃ bildet, n ungleich 2 ist und R³ nicht für den Rest


15 und deren pharmazeutisch verwendbaren Hydrate und Säure-additionssalze sowie die Alkali-, Erdalkali-, Silber- und Guanidiniumsalze der zugrundeliegenden Carbonsäuren.

Besonders bevorzugt sind auch diejenigen Verbindungen der Formel (I), in denen

20 R¹ für Ethyl, Cyclopropyl, 2-Fluorethyl, Vinyl, Methylamino, Phenyl, 4-Fluorphenyl, 2,4-Difluorphenyl,

R² für Wasserstoff, Methyl, Ethyl,

R³ für einen im Ringsystem ein- oder mehrfach, bevorzugt 2-fach, durch Methyl substituierten Rest der Formel



in welcher

Y für $\text{R}^4\text{-N}$,

Z für $-(\text{CH}_2)_n-$,

n für 1 oder 2,

5 R^4 für Wasserstoff, gegebenenfalls durch Hydroxy substituiertes Alkyl, Alkenyl oder Alkinyl mit 1 bis 3 Kohlenstoffatomen, gegebenenfalls durch Nitro oder Amino substituiertes Benzyl oder Oxoalkyl mit 2 bis 4 Kohlenstoffatomen und

10 R^5 für Wasserstoff oder Methyl steht,

X^1 für Fluor, Chlor oder Nitro und

A für N oder C-R^6 steht, worin


R^6 für Wasserstoff, Fluor, Chlor oder Nitro steht oder auch gemeinsam mit R^1 eine Brücke der Struktur

15 $-\text{O}-\text{CH}_2-\underset{|}{\text{CH}}-\text{CH}_3$ oder $-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\underset{|}{\text{CH}}-\text{CH}_3$

bilden kann,

und deren pharmazeutisch verwendbaren Hydrate und Säureadditionssalze sowie die Alkali-, Erdalkali-, Silber- und Guanidiniumsalze der zugrundeliegenden Carbonsäuren.

Weiterhin wurde gefunden, daß man die Verbindungen der Formel (I) erhält, wenn Verbindungen der Formel (II)



(II),

in welcher R¹, R², X¹ und A die oben angegebene Bedeutung haben und


- 5 X² für Halogen, insbesondere Fluor oder Chlor, steht,
mit Azabicycloalkanen der Formel (III)



(III),

in welcher R³ die oben angegebene Bedeutung hat, gegebenenfalls in Gegenwart von Säurebindungsmitteln umgesetzt (Methode A).

- 10 Erfindungsgemäße Verbindungen der Formel (I)



(I),

in welcher

5

R^1 , R^2 , A und X^1 die oben angegebene Bedeutung haben und

R^3 für einen im Ringsystem gegebenenfalls ein- oder
mehrfach, bevorzugt 2-fach, durch Hydroxy oder Methyl
substituierten Rest der Formel

10



15

in welcher


Z und R^4 die oben angegebene Bedeutung haben,

20

steht,

können auch erhalten werden, indem man eine Verbindung der
Formel (IV)

25



(IV),

30


in welcher

R^1 , R^2 , A und X^1 die oben angegebene Bedeutung haben und

35

R^7 für einen Rest der Formel

5



in welcher

10

Z die oben angegebene Bedeutung hat,
steht, mit Verbindungen der Formel (V)



15

in welcher

R⁴ die oben angegebene Bedeutung hat, aber nicht für
Wasserstoff stehen kann, und

20

X³ für Halogen, insbesondere Chlor, Brom oder Jod,
steht, gegebenenfalls in Gegenwart von Säurebin-
dungsmitteln umgesetzt (Methode B).

25

Man erhält erfindungsgemäße Verbindungen der Formel (I),
in der R⁴ für CH₃-CO-CH₂CH₂ steht,
auch durch Umsetzung einer Verbindung der Formel (IV) mit
Methylvinylketon (Methode C).


30

Verwendet man bei der Umsetzung nach Methode A 1-Cyclopro-
pyl-6,7-difluor-1,4-dihydro-4-oxo-3-chinolin-carbonsäure
und 1,4-Diazabicyclo[3.2.1]octan als Ausgangsstoffe, so
kann der Reaktionsablauf durch das folgende Formelschema
wiedergegeben werden:

35

0230274


5



10

Verwendet man bei der Umsetzung nach Methode B 1-Cyclopropyl-7-(2,5-diazabicyclo[2.2.2]oct-2-yl)-6,8-difluor-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarbonsäure und Ethyliodid als Ausgangsstoffe, so kann der Reaktionsablauf durch das folgende Formelschema wiedergegeben werden:

20




25

30

Verwendet man bei der Umsetzung nach Methode C 1-Cyclopropyl-7-(3,8-diazabicyclo[3.2.1]oct-3-yl)-6-fluor-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarbonsäure und Methylvinylketon als Ausgangsverbindungen, so kann der Reaktionsablauf durch das folgende Formelschema wiedergegeben werden:

35



15 Die als Ausgangsstoffe verwendeten Verbindungen der Formel (II) sind bekannt oder können nach bekannten Methoden hergestellt werden. Als Beispiele seien genannt:

20 7-Chlor-1-cyclopropyl-6-fluor-1,4-dihydro-4-oxo-3-chinolincarbonsäure (Deutsche Patentanmeldung 3 142 854),

1-Cyclopropyl-6,7-difluor-1,4-dihydro-4-oxo-3-chinolincarbonsäure (Europäische Patentanmeldung 113 091),

25 6-Chlor-1-cyclopropyl-7,8-difluor-1,4-dihydro-4-oxo-3-chinolincarbonsäure (Deutsche Patentanmeldung 3 420 743),

8-Chlor-1-cyclopropyl-6,7-difluor-1,4-dihydro-4-oxo-3-chinolincarbonsäure (Deutsche Patentanmeldung 3 420 743),

30 1-Cyclopropyl-6,7,8-trifluor-1,4-dihydro-4-oxo-3-chinolincarbonsäure (Deutsche Patentanmeldung 3 318 145),

35 6,8-Dichlor-1-cyclopropyl-7-fluor-1,4-dihydro-4-oxo-3-chinolincarbonsäure (Deutsche Patentanmeldung 3 420 743),

- 5 7-Chlor-1-cyclopropyl-1,4-dihydro-6-nitro-4-oxo-3-chinolin-
carbonsäure (Europäische Patentanmeldung 113 091),
- 6,7-Dichlor-1-cyclopropyl-1,4-dihydro-4-oxo-3-chinolin-
carbonsäure (Europäische Patentanmeldung 113 091),
- 10 1-Cyclopropyl-6,7-difluor-1,4-dihydro-8-methyl-4-oxo-3-
chinolincarbonsäure,
- 1-Cyclopropyl-7-chlor-6-fluor-1,4-dihydro-8-nitro-4-oxo-3-
chinolincarbonsäure,
- 15 6,7-Difluor-1-ethyl-1,4-dihydro-4-oxo-3-chinolincarbonsäure,
- 7-Chlor-6-fluor-1-ethyl-1,4-dihydro-4-oxo-3-chinolincarbon-
säure,
- 20 7-Chlor-6-fluor-1,4-dihydro-1-(2-hydroxyethyl)-4-oxo-3-chi-
nolincarbonsäure,
- 6,7-Difluor-1-(2-fluorethyl)-1,4-dihydro-4-oxo-3-chinolin-
carbonsäure,
- 25 7-Chlor-6-fluor-1,4-dihydro-1-methoxy-4-oxo-3-chinolincar-
bonsäure,
- 30 7-Chlor-6-fluor-1,4-dihydro-1-methylamino-4-oxo-3-chino-
lincarbonsäure,
- 6,7-Difluor-1,4-dihydro-4-oxo-1-phenyl-3-chinolincarbon-
säure,
- 35

- 5 7-Chlor-1-cyclopropyl-6-fluor-1,4-dihydro-4-oxo-1,8-naphthyridin-3-carbonsäure,
- 6,7-Dichlor-1-cyclopropyl-1,4-dihydro-4-oxo-1,8-naphthyridin-3-carbonsäure,
- 10 1-Cyclopropyl-6,7,8-trifluor-1,4-dihydro-4-oxo-3-chinolin-carbonsäureethylester (Deutsche Patentanmeldung 3 318 145),
- 15 9,10-Difluor-2,3-dihydro-3-methyl-7-oxo-7H-pyrido-[1,2,3-de][1,4]benzoxacin-6-carbonsäure (Europäische Patentanmeldung 47 005),
- 20 8,9-Difluor-6,7-dihydro-5-methyl-1-oxo-1H,5H-benzol[i,j]-chinolicin-2-carbonsäure,
- 7-Chlor-6-fluor-1-phenyl-1,4-dihydro-4-oxo-1,8-naphthyridin-3-carbonsäure (Europäische Patentanmeldung 153 580),
- 25 7-Chlor-6-fluor-1-(4-fluorphenyl)-1,4-dihydro-4-oxo-1,8-naphthydrin-3-carbonsäure (Europäische Patentanmeldung 153 580),
- 6,7,8-Trifluor-1,4-dihydro-1-methylamino-4-oxo-3-chinolin-carbonsäure (Deutsche Patentanmeldung 3 409 922),
- 30 1-Amino-6,7,8-trifluor-1,4-dihydro-4-oxo-3-chinolin-carbonsäure (Deutsche Patentanmeldung 3 409 922),
- 35 6,7,8-Trifluor-1,4-dihydro-1-dimethylamino-4-oxo-3-chinolin-carbonsäure (Deutsche Patentanmeldung 3 409 922),

- 5 7-Chlor-6-fluor-1,4-dihydro-8-nitro-4-oxo-1-phenyl-3-chinolincarbonsäure,
- 7-Chlor-6-fluor-1-(4-fluorphenyl)-1,4-dihydro-8-nitro-4-oxo-3-chinolincarbonsäure,
- 10 6,7-Difluor-1-(4-fluorphenyl)-1,4-dihydro-8-methyl-4-oxo-3-chinolincarbonsäure,
- 6-Chlor-7-fluor-1-(4-fluorphenyl)-1,4-dihydro-4-oxo-3-chinolincarbonsäure (Europäische Patentanmeldung 131 839),
- 15 6-Chlor-7-fluor-1-(2,4-difluorphenyl)-1,4-dihydro-4-oxo-3-chinolincarbonsäure (Europäische Patentanmeldung 131 839),
- 6,7,8-Trifluor-1-(4-fluorphenyl)-1,4-dihydro-4-oxo-3-chinolincarbonsäure (Europäische Patentanmeldung 154 780),
- 20 6,7,8-Trifluor-1-(2,4-difluorphenyl)-1,4-dihydro-4-oxo-3-chinolincarbonsäure (Europäische Patentanmeldung 154 780),
- 25 6,7,8-Trifluor-1,4-dihydro-4-oxo-1-phenyl-3-chinolincarbonsäure (Europäische Patentanmeldung 154 780),
- 7-Chlor-1-ethyl-6-fluor-1,4-dihydro-4-oxo-1,8-naphthyridin-3-carbonsäure,
- 30 6,7-Difluor-1,4-dihydro-4-oxo-1-vinyl-3-chinolincarbonsäure.
- 35

- Die als Ausgangsverbindungen verwendeten Azabicycloalkane der Formel (III) sind zum Teil bekannt oder können nach bekannten Verfahren hergestellt werden. Die Verbindungen können als Racemate oder nach Auftrennung in die Enantiomeren als enantiomeren-reine Azabicycloalkane eingesetzt werden. Als Beispiele seien genannt:
- 1,4-Diazabicyclo[3.2.1]octan [US-Pat. 3 281 423, J. Med. Chem. 20, 1333 (1977)],
- 8-Methyl-3,8-diazabicyclo[3.2.1]octan-Dihydrochlorid [J. Med. Chem. 17, 481 (1974)],
- 3-Methyl-3,8-diazabicyclo[3.2.1]octan-Dihydrochlorid [J. Med. Chem. 17, 481 (1974)],
- 2,5-Diazabicyclo[2.2.1]heptan-Dihydrochlorid [J. Org. Chem. 31, 1059 (1966)],
- 2-Methyl-2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptan-Dihydrochlorid [J. Org. Chem. 31, 1059 (1966); J. Med. Chem. 17 481 (1974)],
- 2-Benzyl-2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptan-Dihydrochlorid [J. Org. Chem. 31, 1059 (1966)],
- 5-Methyl-1,4-diazabicyclo[3.2.1]octan,
- 8-Ethyl-3,8-diazabicyclo[3.2.1]octan,
- 8-Benzyl-3,8-diazabicyclo[3.2.1]octan,

- 5 8-(4-Nitrobenzyl)-3,8-diazabicyclo[3.2.1]octan,
8-(4-Aminobenzyl)-3,8-diazabicyclo[3.2.1]octan,
3-Ethyl-3,8-diazabicyclo[3.2.1]octan,
10 3-Benzyl-3,8-diazabicyclo[3.2.1]octan,
3-(4-Aminobenzyl)-3,8-diazabicyclo[3.2.1]octan,
2,5-Diazabicyclo[2.2.2]octan-Dihydrochlorid
15 [J. Med. Chem. 17, 481 (1974)],
2-Methyl-2,5-diazabicyclo[2.2.2]octan-Dihydrochlorid
[J. Med. Chem. 17, 481 (1974)],
20 2-Ethyl-2,5-diazabicyclo[2.2.2]octan,
2-Benzyl-2,5-diazabicyclo[2.2.2]octan,
25 2-(4-Aminobenzyl)-2,5-diazabicyclo[2.2.2]octan,
8-Propyl-3,8-diazabicyclo[3.2.1]octan,
3-Isopropyl-3,8-diazabicyclo[3.2.1]octan,
30 2-Butyl-2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptan,
2-Isobutyl-2,5-diazabicyclo[2.2.2]octan,
35 8-(2-Hydroxyethyl)-3,8-diazabicyclo[3.2.1]octan,

- 5 3-(2-Hydroxyethyl)-3,8-diazabicyclo[3.2.1]octan,
2-(2-Hydroxyethyl)-2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptan,
2-(2-Hydroxyethyl)-2,5-diazabicyclo[2.2.2]octan,
10 1,4-Diazabicyclo[3.1.1]heptan,
3,9-Diazabicyclo[3.3.1]nonan,
7-Hydroxy-3,9-diazabicyclo[3.3.1]nonan [Chem. Heterocyclic
15 Compounds USSR 1, 195 (1965)],
7-Hydroxy-9-methyl-3,9-diazabicyclo[3.3.1]nonan,
3-Oxa-7,9-diazabicyclo[3.3.1]nonan,
20 3-Oxa-9-azabicyclo[3.3.1]nonan,
2,5-Diazabicyclo[3.1.1]heptan,
25 1,4-Diazabicyclo[3.3.1]nonan,
2,5,9-Triazabicyclo[3.2.2]nonan,
6-Thia-3,8-diazabicyclo[3.2.1]octan.
30

Die Ausgangsverbindungen der Formel IV sind unbekannt. Sie entsprechen den erfindungsgemäßen Verbindungen der Formel I, in welcher der Rest R⁴ für Wasserstoff steht.

35

Die Ausgangsverbindungen der Formel V sind bekannt. Als
5 Beispiele seien genannt:

Methyljodid, Methylbromid, Methylchlorid, Ethyljodid,
Ethylbromid, Benzylbromid, Benzylchlorid, 4-Nitrobenzyl-
bromid, 2-Chlorethanol, 2-Bromethanol, 2-Jodethanol, 3-
10 Brompropanol, 4-Jodbutanol, Chloraceton, 1-Chlor-2-
butanon, 1-Brom-3-butanon, Allylbromid, Propargylbromid.
Auch Methylvinylketon ist bekannt.

Die Umsetzung von (II) mit (III) gemäß Methode A, bei der
15 die Diazabicycloalkane (III) auch in Form ihrer Hydro-
chloride eingesetzt werden können, wird vorzugsweise in
einem Verdünnungsmittel wie Dimethylsulfoxid, N,N-
Dimethylformamid, Hexamethyl-phosphorsäuretrisamid, Sul-
folan, Acetonitril, Wasser, einem Alkohol wie Methanol,
20 Ethanol, n-Propanol, Isopropanol, Glykolmonomethylether
oder Pyridin vorgenommen. Ebenso können Gemische dieser
Verdünnungsmittel verwendet werden.

Als Säurebinder können alle üblichen anorganischen und
25 organischen Säurebindungsmittel verwendet werden. Hierzu
gehören vorzugsweise die Alkalihydroxide, Alkalicarbonat,
organische Amine und Amidine. Als besonders geeignet seien
im einzelnen genannt: Triethylamin, 1,4-Diaza-bicyclo-
[2.2.2]octan (DABCO), 1,8-Diazabicyclo[5,4,0]undec-7-en
30 (DBU) oder überschüssiges Amin (III).

Die Reaktionstemperaturen können in einem größeren Bereich
variiert werden. Im allgemeinen arbeitet man zwischen etwa
20 und 200°C, vorzugsweise zwischen 80 und 180°C.
35

5 Die Umsetzung kann bei Normaldruck, aber auch bei erhöhtem Druck durchgeführt werden. Im allgemeinen arbeitet man bei Drucken zwischen etwa 1 und 100 bar, vorzugsweise zwischen 1 und 10 bar.

10 Bei der Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens setzt man auf 1 Mol der Carbonsäure (II) 1 bis 15 Mol, vorzugsweise 1 bis 6 Mol der Verbindung (III) ein.

15 Freie Hydroxygruppen können während der Umsetzung durch eine geeignete Hydroxyschutzgruppe, zum Beispiel durch den Tetrahydropyranylrest, geschützt und nach Beendigung der Reaktion wieder freigesetzt werden.

20 Die Umsetzung von (IV) mit (V) gemäß Methode B wird vorzugsweise in einem Verdünnungsmittel wie Dimethylsulfoxid, Dioxan, N,N-Dimethylformamid, Hexamethyl-phosphorsäuretriamid, Sulfolan, Wasser, einem Alkohol wie Methanol, Ethanol, n-Propanol, Isopropanol, Glykolmonomethylether oder Pyridin vorgenommen. Ebenso können Gemische dieser Verdünnungsmittel verwendet werden.

25 Als Säurebinder können alle üblichen anorganischen und organischen Säurebindemittel verwendet werden. Hierzu gehören vorzugsweise die Alkalihydroxide, Alkalicarbonate, organische Amine und Amidine. Als besonders geeignet seien
30 im einzelnen genannt: Triethylamin, 1,4-Diazabicyclo-[2.2.2]octan (DABCO) oder 1,8-Diazabicyclo[5,4,0]undec-7-en (DBU).

35

5 Zur Beschleunigung der Umsetzung können Phasentransfer-
katalysatoren wie Tetrabutylammoniumbromid, Tetrabutyl-
ammioniumchlorid oder Benzyl-triethyl-ammoniumchlorid
zugegeben werden.

10 Die Reaktionstemperaturen können in einem größeren Bereich
variiert werden. Im allgemeinen arbeitet man zwischen etwa
20 und etwa 180°C, vorzugsweise zwischen 40 und 110°C.

15 Die Umsetzung kann bei Normaldruck, aber auch bei erhöhtem
Druck durchgeführt werden. Im allgemeinen arbeitet man bei
Drucken zwischen etwa 1 und etwa 100 bar, vorzugsweise
zwischen 1 und 10 bar.

20 Bei der Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens
gemäß Methode B setzt man auf 1 Mol der Verbindung (IV)
1 bis 4 Mol, vorzugsweise 1 bis 1,5 Mol der Verbindung (V)
ein.

25 Die Umsetzung von (IV) mit Methylvinylketon (Methode C)
wird vorzugsweise in einem Verdünnungsmittel wie Dioxan,
Dimethylsulfoxid, N,N-Dimethylformamid, Methanol, Ethanol,
Isopropanol, n-Propanol, Glykolmonomethylether oder auch
in Gemischen dieser Verdünnungsmittel durchgeführt.

30 Die Reaktionstemperaturen können in einem größeren Bereich
variiert werden. Im allgemeinen arbeitet man zwischen etwa
20°C und etwa 150°C, vorzugsweise zwischen 50°C und
100°C.

35

5 Die Umsetzung kann bei Normaldurck, aber auch bei erhöhtem Druck durchgeführt werden. Im allgemeinen arbeitet man bei Drucken zwischen etwa 1 und etwa 100 bar, vorzugsweise zwischen 1 und 10 bar.

10 Bei der Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens setzt man auf 1 Mol der Verbindung (IV) 1 bis 5 Mol, vorzugsweise 1 bis 2 Mol Methylvinylketon ein.

15 Zur Herstellung der erfindungsgemäßen Ester wird die zugrundeliegende Carbonsäure vorzugsweise in überschüssigem Alkohol in Gegenwart von starken Säuren, wie Schwefelsäure, wasserfreiem Chlorwasserstoff, Methansulfonsäure, p-Toluolsulfonsäure oder sauren Ionenaustauschern, bei Temperaturen von etwa 20° bis 200° C, vorzugsweise etwa 60° bis 120° C umgesetzt. Das entstehende Reaktionswasser kann
20 auch durch azeotrope Destillation mit Chloroform, Tetrachlormethan, Benzol oder Toluol entfernt werden.

25 Die als Prodrug verwendeten (5-Methyl-2-oxo-1,3-dioxol-4-yl-methyl)-ester werden durch Umsetzung eines Alkalisalzes der zugrundeliegenden Carbonsäure mit 4-Brommethyl- oder 4-Chlormethyl-5-methyl-1,3-dioxol-2-on in einem Lösungsmittel wie Dimethylformamid, Dimethylacetamid, Dimethylsulfoxid oder Tetramethylharnstoff bei Temperaturen von etwa 0° bis 100° C, vorzugsweise 0° bis 50° C, erhalten.

30 Die Einführung eines Aminobenzylrestes R^4 erfolgt durch Reduktion eines bereits im Wirkstoff der Formel I eingeführten Nitrobenzylrestes durch katalytisch angeregten Wasserstoff oder chemisch durch Reduktion mit Eisen oder
35 Zink.

- Die Herstellung der Säureadditionssalze der erfindungs-
gemäß n Verbindung n erfolgt in üblicher W ise zum
Beispiel durch Lösen des Betains in überschüssiger wäß-
riger Säure und Ausfällen des Salzes mit einem mit Wasser
mischbaren organischen Lösungsmittel wie Methanol,
Ethanol, Aceton, Acetonitril. Man kann auch äquivalente
Mengen Betain und Säure in Wasser oder einem Alkohol wie
Glykolmonomethylether erhitzen und anschließend bis zur
Trockne eindampfen oder das ausgefallene Salz absaugen.
Als pharmazeutisch verwendbare Salze sind beispielsweise
die Salze von Salzsäure, Schwefelsäure, Essigsäure, Gly-
kolsäure, Milchsäure, Bernsteinsäure, Zitronensäure,
Weinsäure, Methansulfonsäure, Galacturonsäure, Glucon-
säure, Embonsäure, Glutaminsäure oder Asparaginsäure zu
verstehen.
- Die Alkali- oder Erdalkalisalze der erfindungsgemäßen Car-
bonsäuren werden beispielsweise durch Lösen des Betains
in unterschüssiger Alkali- oder Erdalkalilauge, Filtra-
tion von ungelöstem Betain und Eindampfen des Filtrats bis
zur Trockne erhalten. Pharmazeutisch geeignet sind
Natrium-, Kalium- oder Calciumsalze. Durch Umsetzung eines
Alkali- oder Erdalkalisalzes mit einem geeigneten Silber-
salz wie Silbernitrat werden die entsprechenden Silber-
salze erhalten.
- Die erfindungsgemäßen Wirkstoffe können sowohl als Race-
mate als auch als enantiomerenreine Verbindungen
vorliegen.
- Außer den in den Beispielen aufgeführten Verbindungen
seien als neue Wirkstoffe im einzelnen genannt:

- 5 6-Chlor-1-cyclopropyl-7-(1,4-diazabicyclo[3.2.1]oct-4-yl)-1,4-dihydro-4-oxo-3-chinolincarbonsäure,
- 1-Cyclopropyl-7-(1,4-diazabicyclo[3.2.1]oct-4-yl)-6-fluor-1,4-dihydro-8-methyl-4-oxo-3-chinolincarbonsäure,
- 10 7-(1,4-Diazabicyclo[3.2.1]oct-4-yl)-6-fluor-1-(2-fluor-ethyl)-1,4-dihydro-4-oxo-3-chinolincarbonsäure,
- 7-(1,4-Diazabicyclo[3.2.1]oct-4-yl)-6-fluor-1-(4-fluor-phenyl)-1,4-dihydro-4-oxo-3-chinolincarbonsäure,
- 15 1-Cyclopropyl-7-(1,4-diazabicyclo[3.2.1]oct-4-yl)-6-fluor-1,4-dihydro-4-oxo-1,8-naphthyridin-3-carbonsäure,
- 7-(1,4-Diazabicyclo[3.2.1]oct-4-yl)-1-ethyl-6-fluor-1,4-dihydro-4-oxo-1,8-naphthyridin-3-carbonsäure,
- 20 7-(1,4-Diazabicyclo[3.2.1]oct-4-yl)-1-ethyl-6-fluor-1,4-dihydro-4-oxo-3-chinolincarbonsäure,
- 25 7-(1,4-Diazabicyclo[3.2.1]oct-4-yl)-9-fluor-6,7-dihydro-5-methyl-1-oxo-1H,5H-benzo[i,j]chinolin-2-carbonsäure,
- 7-(1,4-Diazabicyclo[3.2.1]oct-4-yl)-6-fluor-1-(4-fluor-phenyl)-1,4-dihydro-4-oxo-1,8-naphthyridin-3-carbonsäure,
- 30 1-Cyclopropyl-7-(1,4-diazabicyclo[3.2.1]oct-4-yl)-6-fluor-1,4-dihydro-4-oxo-3-chinolincarbonsäureethylester,

35

0230274

- 5 1-Cyclopropyl-7-(1,4-diazabicyclo[3.2.1]oct-4-yl)-6-fluor-
1,4-dihydro-4-oxo-3-chinolincarbonsäure-(5-methyl-2-oxo-
1,3-dioxol-4-yl-methyl)-ester,
- 10 1-Cyclopropyl-7-(1,4-diazabicyclo[3.1.1]hept-4-yl)-6-
fluor-1,4-dihydro-4-oxo-3-chinolincarbonsäure,
- 15 1-Cyclopropyl-7-(1,4-diazabicyclo[3.1.1]hept-4-yl)-6,8-
difluor-1,4-dihydro-4-oxo-3-chinolincarbonsäure,
- 8-Chlor-1-cyclopropyl-7-(1,4-diazabicyclo[3.1.1]hept-4-
yl)-6-fluor-1,4-dihydro-4-oxo-3-chinolincarbonsäure,
- 20 1-Cyclopropyl-7-(1,4-diazabicyclo[3.1.1]hept-4-yl)-6-
fluor-1,4-dihydro-8-methyl-4-oxo-3-chinolincarbonsäure,
- 25 1-Cyclopropyl-7-(1,4-diazabicyclo[3.1.1]hept-4-yl)-6-
fluor-1,4-dihydro-4-oxo-3-chinolincarbonsäure-
methylester,
- 30 1-Cyclopropyl-6,8-difluor-1,4-dihydro-7-(8-methyl-3,8-
diazabicyclo[3.2.1]oct-3-yl)-4-oxo-3-chinolincarbonsäure,
- 8-Chlor-1-cyclopropyl-6-fluor-1,4-dihydro-7-(8-methyl-3,8-
diazabicyclo[3.2.1]oct-3-yl)-4-oxo-3-chinolincarbonsäure,

35

Le A 24 318

0230274

- 5 1-Cyclopropyl-6-fluor-1,4-dihydro-7-(8-methyl-3,8-diaza-
bicyclo[3.2.1]oct-3-yl)-4-oxo-1,8-naphthyridin-3-carbon-
säure,
- 10 1-Cyclopropyl-6-fluor-1,4-dihydro-7-(3-methyl-3,8-diaza-
bicyclo[3.2.1]oct-8-yl)-4-oxo-3-chinolincarbonsäure,
- 1-Cyclopropyl-6,8-difluor-1,4-dihydro-7-(3-methyl-3,8-
diazabicyclo[3.2.1]oct-8-yl)-4-oxo-3-chinolincarbonsäure,
- 15 8-Chlor-1-cyclopropyl-6-fluor-1,4-dihydro-7-(3-methyl-3,8-
diazabicyclo[3.2.1]oct-8-yl)-4-oxo-3-chinolincarbonsäure,
- 1-Cyclopropyl-7-(2,5-diazabicyclo[2.2.1]hept-2-yl)-6-
fluor-1,4-dihydro-4-oxo-3-chinolincarbonsäure,
- 20 1-Cyclopropyl-7-(2,5-diazabicyclo[2.2.1]hept-2-yl)-6,8-
difluor-1,4-dihydro-4-oxo-3-chinolincarbonsäure,
- 8-Chlor-1-cyclopropyl-7-(2,5-diazabicyclo[2.2.1]-hept-2-
yl)-7-fluor-1,4-dihydro-4-oxo-3-chinolincarbonsäure,
- 25 1-Cyclopropyl-7-(2,5-diazabicyclo[2.2.1]hept-2-yl)-6-
fluor-1,4-dihydro-4-oxo-1,8-naphthyridin-3-carbonsäure,
- 1-Cyclopropyl-6-fluor-1,4-dihydro-7-[5-(2-hydroxyethyl)-
2,5-diazabicyclo[2.2.1]hept-2-yl]-4-oxo-3-chinolincar-
bonsäure,
- 30

35

- 5 1-Cyclopropyl-6-fluor-1,4-dihydro-4-oxo-7-[5-(2-oxo-propyl)-2,5-diazabicyclo[2.2.1]hept-2-yl]-3-chinolincarbonsäure,
- 10 1-Cyclopropyl-6-fluor-1,4-dihydro-7-(5-methyl-2,5-diazabicyclo[2.2.1]hept-2-yl)-4-oxo-3-chinolincarbon-säure,
- 15 1-Cyclopropyl-6,8-difluor-1,4-dihydro-7-(5-methyl-2,5-diazabicyclo[2.2.1]hept-2-yl)-4-oxo-3-chinolin-carbonsäure,
- 20 8-Chlor-1-cyclopropyl-6-fluor-1,4-dihydro-7-(5-methyl-2,5-diazabicyclo[2.2.1]hept-2-yl)-4-oxo-3-chinolincarbon-säure,
- 25 1-Cyclopropyl-7-(8-ethyl-3,8-diazabicyclo[3.2.1]oct-3-yl)-6-fluor-1,4-dihydro-4-oxo-3-chinolincarbon-säure,
- 30 1-Cyclopropyl-7-(8-(4-Aminobenzyl)-3,8-diazabicyclo[3.2.1]oct-3-yl)-1-cyclopropyl-6-fluor-1,4-dihydro-4-oxo-3-chinolincarbon-säure,
- 35 1-Cyclopropyl-7-(2,5-diazabicyclo[2.2.2]oct-2-yl)-6-fluor-1,4-dihydro-4-oxo-3-chinolincarbon-säure,
- 1-Cyclopropyl-7-(2,5-diazabicyclo[2.2.2]oct-2-yl)-6,8-difluor-1,4-dihydro-4-oxo-3-chinolincarbon-säure,

- 5 8-Chlor-1-cyclopropyl-7-(2,5-diazabicyclo[2.2.2]oct-2-yl)-
7-fluor-1,4-dihydro-4-oxo-3-chinolincarbonsäure,
- 1-Cyclopropyl-7-(2,5-diazabicyclo[2.2.2]oct-2-yl)-6-fluor-
1,4-dihydro-4-oxo-1,8-naphthyridin-3-carbonsäure,
- 10 1-Cyclopropyl-6-fluor-1,4-dihydro-7-(5-methyl-2,5-diaza-
bicyclo[2.2.2]oct-2-yl)-4-oxo-3-chinolincarbonsäure,
- 1-Cyclopropyl-6,8-difluor-1,4-dihydro-7-(5-methyl-2,5-di-
azabicyclo[2.2.2]oct-2-yl)-4-oxo-3-chinolincarbonsäure,
- 15 8-Chlor-1-cyclopropyl-6-fluor-1,4-dihydro-7-(5-methyl-2,5-
diazabicyclo[2.2.2]oct-2-yl)-4-oxo-3-chinolincarbonsäure,
- 1-Cyclopropyl-7-(3,9-diazabicyclo[3.3.1]non-3-yl)-6-fluor-
1,4-dihydro-4-oxo-3-chinolincarbonsäure,
- 20 1-Cyclopropyl-6-fluor-1,4-dihydro-7-(7-hydroxy-3,9-diaza-
bicyclo[3.3.1]non-3-yl)-4-oxo-3-chinolincarbonsäure,
- 25 1-Cyclopropyl-6-fluor-1,4-dihydro-7-(3-oxa-7,9-diaza-
bicyclo[3.3.1]non-7-yl)-4-oxo-3-chinolincarbonsäure,
- 7-(5-Allyl-2,5-diazabicyclo[2.2.1]hept-2-yl)-1-cyclo-
propyl-6-fluor-1,4-dihydro-4-oxo-3-chinolincarbonsäure,
- 30 1-Cyclopropyl-6-fluor-1,4-dihydro-4-oxo-7-(5-propargyl-
2,5-diazabicyclo[2.2.2]oct-2-yl)-3-chinolincarbonsäure.

35

Beispiel für eine erfindungsgemäße Tablette

5

Jede Tablette enthält:

	Verbindung des Beispiels 1	583,0 mg
	Mikrokristalline Cellulose	55,0 mg
10	Maisstärke	72,0 mg
	Poly-(1-vinyl-2-pyrrolidon) unlöslich	30,0 mg
	Hochdisperses Siliciumdioxid	5,0 mg
	Magnesiumstearat	<u>5,0 mg</u>
		750,0 mg

15

Die Lackhülle enthält:

	Poly-(O-hydroxypropyl-O-methyl)- cellulose 15 cp	6,0 mg
20	Macrogol 4000 rec. INN	2,0 mg
	Polyethylenglykole (DAB)	
	Titan-(IV)-oxid	<u>2,0 mg</u>
		10,0 mg

25

30

35

5 Di erfindungsgemäßen Verbindungen zeigen bei geringer
Toxizität ein breites antibakterielles Spektrum gegen
gram-positive und gram-negative Keime, insbesondere gegen
Enterobacteriaceen; vor allem auch gegen solche, die re-
sistent sind gegen verschiedene Antibiotika, wie z.B.
10 Penicilline, Cephalosporine, Aminoglykoside, Sulfonamide,
Tetracycline.

Diese wertvollen Eigenschaften ermöglichen ihre Verwendung
als chemotherapeutische Wirkstoffe in der Medizin sowie
15 als Stoffe zur Konservierung von anorganischen und organi-
schen Materialien, insbesondere von organischen Materia-
lien aller Art, z.B. Polymeren, Schmiermitteln, Farben,
Fasern, Leder, Papier und Holz, von Lebensmitteln und von
Wasser.

20 Die erfindungsgemäßen Verbindungen sind gegen ein sehr
breites Spektrum von Mikroorganismen wirksam. Mit ihrer
Hilfe können gram-negative und gram-positive Bakterien und
bakterienähnliche Mikroorganismen bekämpft sowie die durch
25 diese Erreger hervorgerufenen Erkrankungen verhindert, ge-
bessert und/oder geheilt werden.

Besonders wirksam sind die erfindungsgemäßen Verbindungen
gegen Bakterien und bakterienähnliche Mikroorganismen. Si
30 sind daher besonders gut zur Prophylaxe und Chemotherapie
von lokalen und systemischen Infektionen in der Human- und
Tiermedizin geeignet, die durch diese Erreger hervorgeru-
fen werden.

35 Beispielsweise können lokale und/oder systemische Erkrän-
kungen behandelt und/oder verhindert werden, die durch die

5 folgenden Erreger oder durch Mischungen d r folgenden Er-
reger verursacht werden:
Gram-positive Kokken, z.B. Staphylokokken (Staph.
aureus, Staph. epidermidis) und Streptokokken (Strept.
agalactiae, Strept. faecalis, Strept. pneumoniae,
10 Strept. pyogenes); gram-negative Kokken (Neisseria
gonorrhoeae) sowie gram-negative Stäbchen wie Entero-
bacteriaceen, z.B. Escherichia coli, Häemophilus
influenzae, Citrobacter (Citrob. freundii, Citrob.
divernis), Salmonella und Shigella; ferner Klebsiellen
15 (Klebs. pneumoniae, Klebs. oxytoca), Enterobacter (Ent.
aerogenes, Ent. agglomerans), Hafnia, Serratia (Serr.
marcescens), Proteus (Pr. mirabilis, Pr. rettgeri, Pr.
vulgaris), Providencia, Yersinia, sowie die Gattung
Acinetobacter. Darüber hinaus umfaßt das antibakterielle
20 Spektrum die Gattung Pseudomonas (Ps. aeruginosa, Ps.
maltophilia) sowie strikt anaerobe Bakterien wie z.B.
Bacteroides fragilis, Vertreter der Gattung Peptococcus,
Peptostreptococcus sowie die Gattung Clostridium; ferner
Mykoplasmen (M. pneumoniae, M. hominis, M. urealyticum)
25 sowie Mykobakterien, z.B. Mycobacterium tuberculosis.

Die obige Aufzählung von Erregern ist lediglich beispiel-
haft und keineswegs beschränkend aufzufassen. Als Krank-
heiten, die durch die genannten Erreger oder Mischinfek-
30 tionen verursacht und durch die erfindungsgemäßen Verbin-
dungen verhindert, gebessert oder geheilt werden können,
seien beispielsweise genannt:

Infektionskrankheiten beim Menschen wie zum Beispiel
35 Otitis, Pharyngitis, Pneumonie, Peritonitis, Pyelonephri-

5 tis, Cystitis, Endocarditis, Systeminfektionen, Bronchitis
(akut, chronisch), septische Infektionen, Erkrankungen der
oberen Luftwege, diffuse Panbronchiolitis, pulmonäres
Emphysem, Dysenterie, Enteritis, Leberabszesse, Urethri-
tis, Prostatitis, Epididymitis, gastrointestinale Infek-
tionen, Knochen- und Gelenkinfektionen, zystische Fibros ,
10 Hautinfektionen, postoperative Wundinfektionen, Abszesse,
Phlegmone, Wundinfektionen, infizierte Verbrennungen,
Brandwunden, Infektionen im Mundbereich, Infektionen nach
Zahnoperationen, Osteomyelitis, septische Arthritis,
Cholecystitis, Peritonitis mit Appendicitis, Cholangitis,
15 intraabdominale Abszesse, Pankreatitis, Sinusitis,
Mastoiditis, Mastitis, Tonsillitis, Typhus, Meningitis und
Infektionen des Nervensystems, Salpingitis, Endometritis,
Genital-Infektionen, Pelveoperitonitis und Augeninfektio-
nen.

20

Außer beim Menschen können bakterielle Infektionen auch
bei anderen Spezies behandelt werden. Beispielhaft seien
genannt:

25 Schwein: Coli-diarrhoe, Enterotoxämie, Sepsis, Dysenterie,
Salmonellose, Metritis-Mastitis-Agalaktiae-Syndrom,
Mastitis;

Wiederkäuer (Rind, Schaf, Ziege): Diarrhoe, Sepsis,
Bronchopneumonie, Salmonellose, Pasteurellose, Mykoplas-
mose, Genitalinfektionen;

30 Pferd: Bronchopneumonien, Fohlenlähme, puerperale und
postpuerperale Infektionen, Salmonellose;

Hund und Katze: Bronchopneumonie, Diarrhoe, Dermatitis,
Otitis, Harnwegsinfekte, Prostatitis;

35

- 5 Geflügel (Huhn, Pute, Wachtel, Taube, Ziervög l und andere): Mycoplasmose, E. coli-Infektionen, chronische Luftwegserkrankungen, Salmonellose, Pasteurellose, Psittakose.
- 10 Ebenso können bakterielle Erkrankungen bei der Aufzucht und Haltung von Nutz- und Zierfischen behandelt werden, wobei sich das antibakterielle Spektrum über die vorher genannten Erreger hinaus auf weitere Erreger wie zum Beispiel Pasteurella, Brucella, Campylobacter, Listeria,
- 15 Erysipelothrix, Corynebakterien, Borellia, Treponema, Nocardia, Rickettsien, Yersinia, erweitert.
- Zur vorliegenden Erfindung gehören pharmazeutische Zubereitungen, die neben nicht-toxischen, inerten pharmazeu-
- 20 tisch geeigneten Trägerstoffen eine oder mehrere erfindungsgemäße Verbindungen enthalten oder die aus einem oder mehreren erfindungsgemäßen Wirkstoffen bestehen, sowie Verfahren zur Herstellung dieser Zubereitungen.
- 25 Zur vorliegenden Erfindung gehören auch pharmazeutische Zubereitungen in Dosierungseinheiten. Dies bedeutet, daß die Zubereitung in Form einzelner Teile, z.B. Tabletten, Dragees, Kapseln, Pillen, Suppositorien und Ampullen vor-
- 30 liegen, deren Wirkstoffgehalt einem Bruchteil oder einem Vielfachen einer Einzeldosis entsprechen. Die Dosierungseinheiten können z.B. 1, 2, 3 oder 4 Einzeldosen oder 1/2, 1/3 oder 1/4 einer Einzeldosis enthalten. Eine Einzeldosis enthält vorzugsweise die Menge Wirkstoff, die bei einer Applikation verabreicht wird und die gewöhnlich einer
- 35 ganzen, einer halben oder einem Drittel oder einem Viertel einer Tagesdosis entspricht.

- 5 Unter nicht-toxischen, inerten pharmazeutisch geeigneten Trägerstoffen sind feste, halbfeste oder flüssige Verdünnungsmittel, Füllstoffe und Formulierungshilfsmittel jeder Art zu verstehen.
- 10 Als bevorzugte pharmazeutische Zubereitungen seien Tabletten, Dragees, Kapseln, Pillen, Granulate, Suppositorien, Lösungen, Suspensionen und Emulsionen, Pasten, Salben, Gele, Cremes, Lotions, Puder und Sprays genannt.
- 15 Tabletten, Dragees, Kapseln, Pillen und Granulate können den oder die Wirkstoffe neben den üblichen Trägerstoffen enthalten, wie (a) Füll- und Streckmittel, z.B. Stärken, Milchzucker, Rohrzucker, Glukose, Mannit und Kieselsäure, (b) Bindemittel, z.B. Carboxymethylcellulose, Alginat,
- 20 Gelatine, Polyvinylpyrrolidon, (c) Feuchthaltemittel, z.B. Glycerin, (d) Sprengmittel, z.B. Agar-Agar, Calciumcarbonat und Natriumcarbonat, (e) Lösungsverzögerer, z.B. Paraffin und (f) Resorptionsbeschleuniger, z.B. quaternäre Ammoniumverbindungen, (g) Netzmittel, z.B. Cetyl-
- 25 alkohol, Glycerinmonostearat, (h) Adsorptionsmittel, z.B. Kaolin und Bentonit und (i) Gleitmittel z.B. Talkum, Calcium- und Magnesiumstearat und feste Polyethylenglykole oder Gemische der unter (a) bis (i) aufgeführten Stoffe.
- 30 Die Tabletten, Dragees, Kapseln, Pillen und Granulate können mit den üblichen, gegebenenfalls Opakisierungsmitteln enthaltenden, Überzügen und Hüllen versehen sein und auch so zusammengesetzt sein, daß sie den oder die Wirkstoffe nur oder bevorzugt in einem bestimmten Teil des Intesti-

35

5 naltraktet gegeben, falls verzögert abgeben, wobei als
Einbettungsmassen z.B. Polymersubstanzen und Wachse ver-
wendet werden können.

10 Der oder die Wirkstoffe können gegebenenfalls mit einem
oder mehreren der oben angegebenen Trägerstoffe auch in
mikroverkapselter Form vorliegen.

15 Suppositorien können neben dem oder den Wirkstoffen die
üblichen wasserlöslichen oder wasserunlöslichen Träger-
stoffe enthalten, z.B. Polyethylenglykole, Fette, z.B.
Kakaofett und höhere Ester (z.B. C₁₄-Alkohol mit C₁₆-Fett-
säure) oder Gemische dieser Stoffe.

20 Salben, Pasten, Cremes und Gele können neben dem oder den
Wirkstoffen die üblichen Trägerstoffe enthalten, z.B. tie-
rische und pflanzliche Fette, Wachse, Paraffine, Stärke,
Tragant, Cellulosederivate, Polyethylenglykole, Silikone,
Bentonite, Kieselsäure, Talkum und Zinkoxid oder Gemische
dieser Stoffe.

25 Puder und Sprays können neben dem oder den Wirkstoffen die
üblichen Trägerstoffe enthalten, z.B. Milchzucker, Talkum,
Kieselsäure, Aluminiumhydroxid, Calciumsilikat und Poly-
amidpulver oder Gemische dieser Stoffe. Sprays können zu-
sätzlich die üblichen Treibmittel, z.B. Chlorfluorkohlen-
30 wasserstoffe, enthalten.

35 Lösungen und Emulsionen können neben dem oder den Wirk-
stoffen die üblichen Trägerstoffe wie Lösungsmittel, Lö-

5 sungsvermittler und Emulgatoren, z.B. Wasser, Ethylalkohol, Isopropylalkohol, Ethylcarbonat, Ethylacetat, Benzylalkohol, Benzylbenzoat, Propylenglykol, 1,3-Butylenglykol, Dimethylformamid, Öle, insbesondere Baumwollsaatöl, Erdnußöl, Maiskeimöl, Olivenöl, Ricinusöl und Sesamöl, Glycerin, Glycerinformal, Tetrahydrofurfurylalkohol, Polyethylenglykole und Fettsäureester des Sorbitans oder Gemische dieser Stoffe enthalten.

10

Zur parenteralen Applikation können die Lösungen und Emulsionen auch in steriler und blutisotonischer Form vorliegen.

15

Suspensionen können neben dem oder den Wirkstoffen die üblichen Trägerstoffe wie flüssige Verdünnungsmittel, z.B. Wasser, Ethylalkohol, Propylenglykol, Suspendiermittel, z.B. ethoxylierte Isostearylalkohole, Polyoxyethylensorbit- und Sorbitan-Ester, mikrokristalline Cellulose, Aluminiummetahydroxid, Bentonit, Agar-Agar und Tragant oder Gemische dieser Stoffe enthalten.

20

Die genannten Formulierungsformen können auch Färbemittel, Konservierungsstoffe sowie geruchs- und geschmacksverbesserte Zusätze, z.B. Pfefferminzöl und Eukalyptusöl und Süßmittel, z.B. Saccharin, enthalten.

25

Die therapeutisch wirksamen Verbindungen sollen in den oben aufgeführten pharmazeutischen Zubereitungen vorzugsweise in einer Konzentration von etwa 0,1 bis 99,5, vorzugsweise von etwa 0,5 bis 95 Gew.-%, der Gesamtmischung vorhanden sein.

30

35

5 Die oben aufgeführten pharmazeutischen Zubereitungen können außer den erfindungsgemäßen Verbindungen auch weitere pharmazeutische Wirkstoffe enthalten.

10 Die Herstellung der oben aufgeführten pharmazeutischen Zubereitungen erfolgt in üblicher Weise nach bekannten Methoden, z.B. durch Mischen des oder der Wirkstoffe mit dem oder den Trägerstoffen.

15 Die genannten Zubereitungen können bei Mensch und Tier entweder oral, rektal, parenteral (intravenös, intramuskulär, subkutan), intracisternal, intravaginal, intraperitoneal, lokal (Puder, Salbe, Tropfen) und zur Therapie von Infektionen in Hohlräumen, Körperhöhlen angewendet werden. Als geeignete Zubereitungen kommen Injektionslösungen,
20 Lösungen und Suspensionen für die orale Therapie, Gele, Aufgußformulierungen, Emulsionen, Salben oder Tropfen in Frage. Zur lokalen Therapie können ophtalmologische und dermatologische Formulierungen, Silber- und andere Salze, Ohrentropfen, Augensalben, Puder oder Lösungen verwendet
25 werden. Bei Tieren kann die Aufnahme auch über das Futter oder Trinkwasser in geeigneten Formulierungen erfolgen. Ferner können Gele, Pulver, Puder, Tabletten, Retard-Tabletten, Premixe, Konzentrate, Granulate, Pellets, Boli, Kapseln, Aerosole, Sprays, Inhalate bei Mensch
30 und Tier angewendet werden. Ferner können die erfindungsgemäßen Verbindungen in andere Trägermaterialien wie zum Beispiel Kunststoffe, (Kunststoffketten zur lokalen Therapie), Kollagen oder Knochenzement eingearbeitet werden.

35

5 Im allgemeinen hat es sich sowohl in der Human- als auch
in der Veterinärmedizin als vorteilhaft erwiesen, den oder
die erfindungsgemäßen Wirkstoffe in Gesamtmengen von etwa
0,5 bis etwa 500, vorzugsweise 5 bis 100 mg/kg Körperge-
wicht je 24 Stunden, gegebenenfalls in Form mehrerer Ein-
10 zelgaben, zur Erzielung der gewünschten Ergebnisse zu ver-
abreichen. Eine Einzelgabe enthält den oder die erfin-
dungsgemäßen Wirkstoffe vorzugsweise in Mengen von etwa
1 bis etwa 80, insbesondere 3 bis 30 mg/kg Körpergewicht.
Es kann jedoch erforderlich sein, von den genannten Dosie-
15 rungen abzuweichen, und zwar in Abhängigkeit von der Art
und dem Körpergewicht des zu behandelnden Objekts, der Art
und der Schwere der Erkrankung, der Art der Zubereitung
und der Applikation des Arzneimittels sowie dem Zeitraum
bzw. Intervall, innerhalb welchem die Verabreichung er-
20 folgt.

So kann es in einigen Fällen ausreichend sein, mit weniger
als der obengenannten Menge Wirkstoff auszukommen, während
in anderen Fällen die oben angeführte Wirkstoffmenge über-
25 schritten werden muß. Die Festlegung der jeweils erforder-
lichen optimalen Dosierung und Applikationsart der Wirk-
stoffe kann durch jeden Fachmann aufgrund seines Fachwis-
sens leicht erfolgen.

Die neuen Verbindungen können in den üblichen Konzentra-
30 tionen und Zubereitungen zusammen mit dem Futter bzw. mit
Futterzubereitungen oder mit dem Trinkwasser gegeben wer-
den. Dadurch kann eine Infektion durch gram-negative oder
gram-positive Bakterien verhindert, gebessert und/oder ge-
heilt werden und dadurch eine Förderung des Wachstums und
35 eine Verbesserung der Verwertung des Futters erreicht wer-
den.

In der nachstehenden Tabelle sind einige MHK-Werte im Vergleich zu 1-Cyclopropyl-6-fluor-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-3-chinolincarbonsäure (Ciprofloxacin) angegeben:

Le A 24 318


Beispiel		MHK (mcg/ml) *)					
Stamm	1	3	12	4	Ciprofloxacin		
E.coli 455/7	2	0,5	4	0,5	2		
Providencia 12052	—	8	16	8	32		
Staph. aur. FK 422	0,25	0,06	0,125	0,125	0,5		
Staph. aur. 1756	0,25	0,06	0,125	0,06	0,5		
Staph. aur. 133	0,125	0,06	0,125	0,06	0,5		
Streptoc. faecal. 27101	0,25	0,06	0,125	0,125	0,5		
Streptoc. faecal. 9790	0,25	0,06	0,125	0,25	0,25		
Pseudomonas aerug. W.	0,5	0,125	0,5	0,5	0,5		

*) Agardilutionstest/Isosensitestagar

5 Die folgenden Beispiele erläutern die Erfindung:

Beispiel 1

10




15 8,1 g (30 mmol) 1-Cyclopropyl-6,7-difluor-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarbonsäure in 60 ml Acetonitril und 90 ml Dimethylformamid werden mit 3,4 g (30 mmol) 1,4-Diazabicyclo[3.2.1]octan und 6,6 g (59 mmol) 1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octan versetzt und 6 Stunden unter Rückfluß er-
 20 hitzt. Nach dem Abkühlen wird die Mischung eingeengt, der Rückstand mit Wasser verrührt und das ungelöste Betain abgesaugt (Schmelzpunkt ab etwa 258° C unter Zersetzung). Dieses wird in 5 ml halbkonzentrierter Salzsäure heiß gelöst, filtriert, mit 40 ml Ethanol versetzt und mit Eis
 25 gekühlt. Das ausgefallene Hydrochlorid wird abgesaugt, mit Ethanol gewaschen und getrocknet. Man erhält 5,3 g (45 % der Theorie) 1-Cyclopropyl-7-(1,4-diazabicyclo[3.2.1]oct-4-yl)-6-fluor-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarbonsäure-Hydrochlorid vom Schmelzpunkt 322° C (unter Zersetzung).

30

35


Beispiel 2



15 3,3 g (9,2 mmol) 1-Cyclopropyl-7-(1,4-diazabicyclo[3.2.1]octan-4-yl)-6-fluor-1,4-dihydro-4-oxo-3-chinolincarbonsäure (Betain aus Beispiel 1) und 1,8 g (4,6 mmol) Embonsäure werden in 35 ml Glykolmonomethylether 4 Stunden unter Rückfluß erhitzt. Die Suspension wird abgekühlt, das Kristallisat abgesaugt, mit Ethanol gewaschen und bei

20 120°C im Vakuum getrocknet. Man erhält 4,7 g 1-Cyclopropyl-7-(1,4-diazabicyclo[3.2.1]oct-4-yl)-6-fluor-1,4-dihydro-4-oxo-3-chinolincarbonsäure-Hemiembonat vom Schmelzpunkt ab 271°C (unter Zersetzung).

25 Beispiel 3



35


5 Man setzt 8-Chlor-1-cyclopropyl-6,7-difluor-1,4-dihydro-4-
oxo-3-chinolincarbonsäure analog Beispiel 1 um und erhält
8-Chlor-1-cyclopropyl-7-(1,4-diazabicyclo[3.2.1]oct-4-yl)-
6-fluor-1,4-dihydro-4-oxo-3-chinolincarbonsäure-Hydrochlorid-Hydrat vom Schmelzpunkt 310°C (unter Zersetzung).

10 $C_{19}H_{19}ClFN_3O_3 \cdot HCl \cdot H_2O$ (446,3)

Berechnet = C 51,1 H 4,96 N 9,41 Cl 15,9

Gefunden = C 51,2 H 4,6 N 9,5 Cl 15,6

15 Beispiel 4



Man setzt 1-Cyclopropyl-6,7,8-trifluor-1,4-dihydro-4-oxo-
3-chinolincarbonsäure analog Beispiel 1 um und erhält 1-
25 Cyclopropyl-7-(1,4-diazabicyclo[3.2.1]oct-4-yl)-6,8-di-
fluor-1,4-dihydro-4-oxo-3-chinolincarbonsäure vom Schmelz-
punkt 275-282°C (unter Zersetzung) und daraus das Hydro-
chlorid vom Schmelzpunkt >310°C unter Zersetzung (schon
30 ab etwa 260°C wird die Substanz langsam dunkel).


35

Le A 24 318

Beispiel 5

5

10




Man setzt analog Beispiel 1 7-Chlor-1-cyclopropyl-1,4-dihydro-6-nitro-4-oxo-3-chinolincarbonsäure um und erhält 1-Cyclopropyl-7-(1,4-diazabicyclo[3.2.1]oct-4-yl)-1,4-dihydro-6-nitro-4-oxo-3-chinolincarbonsäure-Hydrochlorid vom Schmelzpunkt 303-307°C (unter Zersetzung).

Beispiel 6

20


25



Man setzt analog Beispiel 1 7-Chlor-1-cyclopropyl-6-fluor-1,4-dihydro-4-oxo-1,8-naphthyridin-3-carbonsäure um und erhält 1-Cyclopropyl-7-(1,4-diazabicyclo[3.2.1]oct-4-yl)-6-fluor-1,4-dihydro-4-oxo-1,8-naphthyridin-3-carbonsäure-Hydrochlorid vom Schmelzpunkt >300°C unter Zersetzung.


35

Beispiel 7



Man setzt analog Beispiel 1 1-Ethyl-6,7,8-trifluor-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolincarbonsäure um und erhält 7-(1,4-Diazabicyclo[3.2.1]oct-4-yl)-1-ethyl-6,8-difluor-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolincarbonsäure-Hydrochlorid vom Schmelzpunkt 308-312° C unter Zersetzung.

Beispiel 8



Eine Mischung aus 2,8 g (10 mmol) 9,10-Difluor-2,3-dihydro-3-methyl-7-oxo-7H-pyrido[1,2,3-de][1,4]benzoxacin-6-carbonsäure und 1,2 g (10,7 mmol) 1,4-Diazabicyclo[3.2.1]octan in 25 ml Dimethylsulfoxid wird mit 2,2 g (20 mmol) 1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octan versetzt und 5 Stunden auf 120° C erhitzt. Die Mischung wird im Vakuum eingeeengt, der


Rückstand mit 40 ml Acetonitril verrührt, der ungelöste
 5 Rückstand abgesaugt und durch Chromatographie an Kieselgel
 mit Dichlormethan/Methanol/20 % wäßrige Ammoniaklösung
 (2:4:1) als Laufmittel gereinigt. Man isoliert 1,2 g
 Festprodukt, das durch Lösen in 8 ml halbkonzentrierter
 Salzsäure und Ausfällen mit 30 ml Ethanol ins Hydrochlorid
 10 überführt wird.

Ausbeute: 1,1 g 10-(1,4-Diazabicyclo[3.2.1]oct-4-yl)-9-
 fluor-2,3-dihydro-3-methyl-7-oxo-7H-pyrido[1,2,3-de][1,4]-
 benzoxacin-6-carbonsäure-Hydrochlorid vom Schmelzpunkt
 355°C unter Zersetzung (wird ab etwa 290°C dunkel).

15

Beispiel 9


20



25

Man setzt analog Beispiel 1 6,7,8-Trifluor-1-(4-fluor-
 phenyl)-1,4-dihydro-4-oxo-3-chinolincarbonsäure um und
 erhält 7-(1,4-Diazabicyclo[3.2.1]oct-4-yl)-6,8-difluor-1-
 (4-fluorphenyl)-1,4-dihydro-4-oxo-3-chinolincarbonsäure-
 30 Hydrochlorid vom Schmelzpunkt 310-314°C unter Zersetzung.

35


Beispiel 10

2,0 g (6 mmol) 7-Chlor-1-cyclopropyl-6-fluor-1,4-dihydro-8-nitro-4-oxo-3-chinolincarbonsäure werden in einer Mischung aus 10 ml Acetonitril und 25 ml Dimethylformamid mit 0,7 g (6 mmol) 1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octan und 0,7 g (6 mmol) 1,4-Diazabicyclo[3.2.1]octan versetzt und 2 Stunden unter Rückfluß erhitzt. Anschließend wird eingeeengt und mit Wasser versetzt. Man läßt unter Eiskühlung auskristallisieren, saugt ab, wäscht mit Wasser und trocknet.

Ausbeute: 1 g (41 % der Theorie) 1-Cyclopropyl-7-(1,4-diazabicyclo[3.2.1]oct-4-yl)-6-fluor-1,4-dihydro-8-nitro-4-oxo-3-chinolincarbonsäure vom Schmelzpunkt 215-232°C (unter Zersetzung). Nach Umkristallisation aus Glykolmonomethylether/Ethanol beträgt der Schmelzpunkt 224-232°C (unter Zersetzung).

Die hierfür benötigte 7-Chlor-1-cyclopropyl-6-fluor-1,4-dihydro-8-nitro-4-oxo-3-chinolincarbonsäure wird über folgende Stufen erhalten:


a) 2,4-Dichlor-5-fluor-3-nitro-benzoesäur



Unter Eiskühlung und Rühren werden 34 ml konzentrierter Schwefelsäure tropfenweise mit 40 ml konzentrierter Salpetersäure versetzt. In dieses Nitriergemisch trägt man portionsweise 20,9 g 2,4-Dichlor-5-fluorbenzoesäure ein, wobei die Temperatur auf 45 - 50°C steigt. Dann wird noch 3 Stunden auf 90 - 100°C erhitzt, das auf Raumtemperatur abgekühlte Gemisch auf 350 ml Eiswasser gegossen, der Niederschlag abgesaugt und mit Wasser gewaschen. Das feuchte Rohprodukt wird in 30 ml Methanol heiß gelöst und die Lösung mit 150 ml Wasser versetzt.


Der Niederschlag wird kalt abgesaugt, mit Methanol/Wasser gewaschen und im Vakuum bei 80°C getrocknet. Es werden 21,2 g rohe 2,4-Dichlor-5-fluor-3-nitrobenzoesäure erhalten. Sie ist genügend rein für die weiteren Umsetzungen. Eine Probe aus Toluol/Petroläther umkristallisiert liefert Kristalle vom Schmelzpunkt 192°C.

b) 2,4-Dichlor-5-fluor-3-nitro-benzoylchlorid



106,6 g 2,4-Dichlor-5-fluor-3-nitro-benzoesäure werden mit 250 ml Thionylchlorid 2 Stunden unter Rückfluß zum Sieden erhitzt. Das überschüssige Thionylchlorid wird dann bei Normaldruck abdestilliert und der Rückstand im Feinvakuum fraktioniert. Bei 110 - 115°C/0,08-0,09 mbar gehen 104,7 g 2,4-Dichlor-5-fluor-3-nitro-benzoylchlorid über. Beim Stehen bilden sich Kristalle vom Schmelzpunkt 35 - 37°C.

c) (2,4-Dichlor-5-fluor-3-nitro-benzoyl)-essigsäure-ethylester




10,1 g Magnesiumspäne werden in 21 ml Ethanol mit 2,1 g Tetrachlormethan versetzt und nach Beginn der Wasserstoff-Entwicklung ein Gemisch aus 66,6 g Malonsäurediethylester, 40 ml Ethanol und 150 ml Toluol bei 50 - 60°C tropfenweise zugefügt. Man rührt 1 Stunde bei dieser Temperatur nach, kühlt auf -5 bis -10°C und tropft langsam eine Lösung von 109,2 g 2,4-Di-

5 chlor-5-fluor-3-nitro-benzoylchlorid in 50 ml Toluol
zu. Danach wird 1 Stunde bei 0° C gerührt, über Nacht
auf Raumtemperatur gebracht und noch 2 Stunden auf
40 - 50° C erwärmt. Das Reaktionsgemisch wird unter
Eiskühlung mit einem Gemisch aus 160 ml Wasser und
10,4 ml konzentrierter Schwefelsäure versetzt und die
10 organische Phase abgetrennt. Die wäßrige Phase wird
mit Toluol extrahiert und der vereinigte organische
Extrakt mit gesättigter Natriumchlorid-Lösung gewa-
schen, mit Natriumsulfat getrocknet und das Lösungs-
mittel abgezogen. Man erhält 144,5 g (2,4-Dichlor-5-
15 fluor-3-nitro-benzoyl)-malonsäurediethylester als
Rohprodukt. Dieses wird nach Zugabe von 200 ml Wasser
und 0,6 g 4-Toluolsulfonsäure 3 Stunden unter Rück-
fluß erhitzt, die Mischung mit Methylenchlorid extra-
20 hiert, der Extrakt mit Natriumsulfat getrocknet und
das Lösungsmittel im Vakuum abdestilliert. Es werden
118 g substituierter Benzoylessigester als Rohprodukt
erhalten. Er besitzt eine für die weiteren Umsetzun-
gen genügende Reinheit.

25 d) 7-Chlor-1-cyclopropyl-6-fluor-1,4-dihydro-8-nitro-4-
oxo-3-chinolincarbonsäure

30




35

- 5 244,8 g (2,4-Dichlor-5-fluor-3-nitro-benzoyl)-essigsäureethylester werden mit 166 g Orthoameisensäuretriethylester und 185 g Essigsäureanhydrid 3 Stunden auf 150 -160°C erhitzt. Man engt im Vakuum ein und erhält 270 g 2-(2,4-Dichlor-5-fluor-3-nitro-benzoyl)-3-ethoxy-acrylsäure-ethylester als öligen Rückstand.
- 10 38 g dieser Zwischenstufe werden in 80 ml Ethanol unter Eiskühlung tropfenweise mit 5,9 g Cyclopropylamin versetzt und 1 Stunde bei 20°C gerührt. Das ausgefallene Produkt wird nach Zugabe von 100 ml Wasser abgesaugt, mit Ethanol/H₂O (1:1) gewaschen und getrocknet. Man erhält 32,8 g 2-(2,4-Dichlor-5-fluor-3-nitro-benzoyl)-3-cyclopropylamino-acrylsäureethylester vom Schmelzpunkt 143 - 146°C.
- 15 7,8 g der vorgenannten Verbindung werden in 30 ml wasserfreiem Dioxan mit 3,1 g (1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-en (DBU) versetzt und 4 Stunden auf 100°C erhitzt. Das Lösungsmittel wird im Vakuum abdestilliert, der Rückstand in Methylenchlorid/Wasser aufgenommen, die Methylenchlorid-Phase abgetrennt, mit Natriumsulfat getrocknet und das Methylenchlorid abdestilliert. Es werden 7,2 g 7-Chlor-1-cyclopropyl-6-fluor-1,4-dihydro-8-nitro-4-oxo-3-quinolincarbonsäureethylester als Rohprodukt erhalten.
- 20 25 Nach Umkristallisation aus Acetonitril schmelzen die hellbraunen Kristalle bei 174 - 175°C.
- 30 Ausbeute: 6 g.
- 35


35,4 g dieses Esters werden in einem Gemisch aus
195 ml Essigsäure, 142 ml Wasser und 22 ml konzen-
trierter Schwefelsäure 1,5 Stunden auf 150°C erhitzt.
Die Lösung wird in 500 ml Eiswasser gegossen, der
Niederschlag abgesaugt, mit Wasser gewaschen und im
Vakuum getrocknet. Ausbeute: 31,8 g 7-Chlor-1-cyclo-
propyl-6-fluor-1,4-dihydro-8-nitro-4-oxo-3-chinolin-
carbonsäure vom Schmelzpunkt 260 - 261°C.

Beispiel 11




530 mg (2 mmol) 1-Cyclopropyl-6,7-difluor-1,4-dihydro-4-
oxo-3-chinolin-carbonsäure werden in 4 ml Acetonitril und
6 ml Dimethylformamid mit 530 mg (2 mmol) 2-Benzyl-2,5-
diazabicyclo[2.2.1]heptan-Dihydrochlorid und 880 mg
(7,9 mmol) 1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octan 6 Stunden unter
Rückfluß erhitzt. Das Reaktionsgemisch wird eingeeengt, der
Rückstand mit Wasser verrührt, der Niederschlag abgesaugt,
mit Wasser gewaschen und getrocknet. Das erhaltene Rohpro-
dukt (0,8 g vom Schmelzpunkt 194 - 205°C und Zersetzung)
wird mit Dichlormethan/Methanol/17 % wäßriger Ammoniumhy-
droxidlösung (150:40:1) als Laufmittel an 60 g Kieselgel
chromatographisch gereinigt. Man erhält 0,57 g (66 % der
Theorie) 7-(5-Benzyl-2,5-diazabicyclo[2.2.1]hept-2-yl)-1-
cyclopropyl-6-fluor-1,4-dihydro-4-oxo-3-chinolin-carbon-
säure vom Schmelzpunkt 205 - 214°C (unter Zersetzung).

Beispiel 12



Analog Beispiel 11 wird mit 8-Methyl-3,8-diazabicyclo-
[3.2.1]octan-Dihydrochlorid umgesetzt und das Rohprodukt
aus Glykolmonomethylether umkristallisiert. Man erhält 1-
Cyclopropyl-6-fluor-1,4-dihydro-7-(8-methyl-3,8-diazabi-
cyclo[3.2.1]oct-3-yl)-4-oxo-3-chinolincarbonsäure vom
Schmelzpunkt 273 - 278° C (unter Zersetzung).


Beispiel 13



Man setzt analog Beispiel 1 mit 5-Methyl-1,4-diazabicyclo-
[3.2.1]octan um und erhält 1-Cyclopropyl-6-fluor-1,4-
dihydro-7-(5-methyl-1,4-diazabicyclo[3.2.1]oct-4-yl)-4-
oxo-3-chinolincarbonsäure-Hydrochlorid vom Schmelzpunkt
>300° C (unter Zersetzung).

5 Das hierfür verwendete 5-Methyl-1,4-diazabicyclo[3.2.1]-
octan wird über folgende Stufen erhalten:

a) 3-Methyl-3-methoxycarbonylmethylpiperazin-2-on




15 Man löst unter Rühren 160 g (1 mol) Citraconsäure-
dimethylester in 300 ml absolutem Ether und fügt 66 g
(1,1 mol) Ethylendiamin hinzu. Die Lösung kommt nach
kurzer Zeit zum Rückfluß und wird über Nacht bei
Raumtemperatur gerührt. Das ausgefallene Produkt wird
20 abgesaugt und aus Dioxan umkristallisiert.

Ausbeute: 125 g (67 % der Theorie)

Schmelzpunkt: 135 - 145°C (aus Dioxan)

25 b) 2-(2-Hydroxyethyl)-2-methylpiperazin




35 Zu einer Suspension von 30,4 g (0,8 mol) Lithium-
aluminiumhydrid in 300 ml absolutem Tetrahydrofuran
tropft man eine heiße Lösung von 74,6 g (0,4 mol)

5 3-Methyl-3-methoxycarbonylmethylpiperazin-2-on in
300 ml absolutem Dioxan. Anschließend rührt man
16 Stunden unter Rückfluß.

10 Dann wird abgekühlt, mit 30 ml Wasser, 30 ml 15 %iger
wäßriger Kalilauge und wieder 30 ml Wasser das über-
schüssige LiAlH_4 zerstört und die anorganischen Salze
abgesaugt. Diese werden noch fünfmal mit Chloroform
gründlich durchgerührt. Die organischen Phasen werden
über Kaliumcarbonat getrocknet, eingeeengt und destil-
liert.

15 Ausbeute: 45 g (78 % der Theorie)
Siedepunkt: $78^\circ\text{C}/0,05\text{ mbar}$.

20 c) 2-(2-Chlorethyl)-2-methylpiperazin-Dihydrochlorid



30 Zu 363 g (3 mol) Thionylchlorid in 500 ml Chloroform
tropft man unter Erhitzen zum Rückfluß und Rühren
110 g (0,76 mol) 2-(2-Hydroxyethyl)-2-methylpiperazin
in 600 ml Chloroform. Dann wird bis zum Ende der SO_2 -
Entwicklung unter Rückfluß erhitzt.

35 Man kühlt ab, tropft 500 ml Wasser hinzu, trennt die
wäßrige Phase ab und wäscht die Chloroform-Phase
zweimal mit 200 ml Wasser. Die wäßrigen Phasen werden
zur Trockene eingedampft, in 1 l Wasser aufgenommen
und mit Aktivkohle 30 Minuten zum Rückfluß erhitzt.

5 Man filtriert, engt zur Trockene ein, wäscht die
Kristalle mit kaltem Methanol, saugt ab und trocknet
im Vakuumexiccator über Phosphorpentoxid.

Ausbeute: 160 g (89,4 % der Theorie)

10 Schmelzpunkt: >300°C.

d) 5-Methyl-1,4-diazabicyclo[3.2.1]octan




20 Man löst 100 g (0,42 Mol) 2-(2-Chlorethyl)-2-methyl-
piperazin · 2HCl in 100 ml Wasser und tropft unter
Eiskühlung eine Lösung von 70 g (1,75 Mol) Natrium-
hydroxid in 70 ml Wasser hinzu. Die Temperatur wird
unter 40°C gehalten. Anschließend erhitzt man 1
Stunde auf 80°C. Die Lösung wird mit Wasser ver-
setzt, um ausgeschiedenes Natriumchlorid aufzulösen
25 und mit Kaliumcarbonat gesättigt. Dann wird mehrfach
mit Chloroform extrahiert, die organischen Phasen
über Kaliumcarbonat getrocknet, eingeengt und destil-
liert.

30 Ausbeute: 45 g (85 % der Theorie)

Siedepunkt: 60°C/6 mbar.


35

Beispiel 14

3,75 g (10 mmol) 1-Cyclopropyl-7-(1,4-diazabicyclo[3.2.1]-
oct-4-yl)-6,8-difluor-1,4-dihydro-4-oxo-3-chinolincarbon-
säure werden in 80 ml Ethanol suspendiert und bei Rück-
flußtemperatur ein trockener Chlorwasserstoffstrom einge-
leitet. Nach beendeter Umsetzung wird eingeeengt, der Rück-
stand in Wasser gelöst, mit Natriumcarbonat-Lösung auf
pH 8 eingestellt, mit Dichlormethan extrahiert, mit Na-
triumsulfat getrocknet und das Filtrat eingeeengt. Der
Rückstand wird aus Ethanol/Wasser umkristallisiert. Man
erhält 1,1 g 1-Cyclopropyl-7-(1,4-diazabicyclo[3.2.1]-oct-
4-yl)-6,8-difluor-1,4-dihydro-4-oxo-3-chinolincarbonsäure-
ethylester vom Schmelzpunkt 196-199° C.


0230274

Beispiel 15




Man setzt analog Beispiel 1 6,7,8-Trifluor-1-(2,4-difluorphenyl)-1,4-dihydro-4-oxo-3-chinolincarbonsäure um und erhält 7-(1,4-Diazabicyclo [3.2.1]oct-4-yl)-6,8-difluor-1-(2,4-difluorphenyl)-1,4-dihydro-4-oxo-3-chinolincarbonsäure-Hydrochlorid vom Schmelzpunkt 329-331°C unter Zersetzung.

Beispiel 16




Man setzt analog Beispiel 1 6,7,8-Trifluor-1,4-dihydro-1-methylamino-4-oxo-3-chinolincarbonsäure um und erhält 7-(1,4-Diazabicyclo[3.2.1]oct-4-yl)-6,8-difluor-1,4-dihydro-1-methylamino-4-oxo-3-chinolincarbonsäure-Hydrochlorid vom Schmelzpunkt 300-305°C unter Zersetzung.

Beispiel 17

- 2,65 g (10 mmol) 1-Cyclopropyl-6,7-difluor-1,4-dihydro-4-oxo-5-chinolinecarbonsäure werden in 20 ml Acetonitril und 10 ml Dimethylformamid mit 2,7 g (24 mmol) 1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octan und 2,1 g (17 mmol) 2-Methyl-1,4-diazabicyclo[3.2.1]octan versetzt und 6 Stunden unter Rückfluß erhitzt. Die Mischung wird eingedampft, der Rückstand mit Wasser versetzt (pH 7), das ungelöste Kristallinat abgesaugt, mit Wasser gewaschen und aus Glykolmonomethylether umkristallisiert. Man erhält 1,4 g 1-Cyclopropyl-6-fluor-1,4-dihydro-7-(2-methyl-1,4-diazabicyclo[3.2.1]oct-4-yl)-4-oxo-5-chinolinecarbonsäure vom Schmelzpunkt 255-257°C (unter Zersetzung).

Das hierfür benötigte 2-Methyl-1,4-diazabicyclo[3.2.1]octan wird auf folgendem Wege erhalten:

5-Methyl-2-methoxycarbonylmethylpiperazin-3-on




- 15 Man mischt 81 g (1,1 mol) 1,2-Propylendiamin, 144 g (1 mol) Maleinsäuredimethylester und 250 ml absoluten Ether. Die Mischung kommt zum Rückfluß und wird gelegentlich mit Eiswasser gekühlt. Anschließend rührt man über Nacht bei Raumtemperatur. Man saugt ab, wäscht mit wenig eiskaltem Isopropanol und trocknet an der

Luft. Die Mutterlaugen werden eingeeengt und der Rückstand aus Essigester umkristallisiert.

Ausbeute: 95 g (51 % d. Th.)


Schmp. : 102 - 105 °C

5 2-(2-Hydroxyethyl)-5-methylpiperazin



- Zu einer Suspension von 30,4 g (0,8 mol) LiAlH_4 in 300 ml abs. Tetrahydrofuran tropft man eine Lösung von 74,5 g (0,4 mol) 5-Methyl-2-methoxycarbonylmethylpiperazin-3-on in 300 ml abs. Tetrahydrofuran. Anschließend erhitzt man 16 Stdn. unter Rückfluß. Dann zersetzt man überschüssiges LiAlH_4 nacheinander mit 30 ml Wasser, 30 ml 15 %iger Kalilauge und 30 ml Wasser, saugt die anorganischen Salze ab und rührt sie mehrfach mit Dichlormethan durch. Die organischen Phasen werden über K_2CO_3 getrocknet, eingeeengt und destilliert.
- 10 Ausbeute: 31,8 g (55,1 % d. Th.)
- 15 Siedepunkt: 85 - 87 °C/0,07 mbar


2-(2-Chlorethyl)-5-methylpiperazin-Dihydrochlorid



Zu 95 g (0,79 mol) Thionylchlorid in 125 ml Methylenchlorid tropft man unter Erhitzen zum Rückfluß 28 g (0,208 mol) 2-(2-


- Hydroxyethyl)-5-methylpiperazin in 125 ml Dichlormethan. Anschließend rührt man 5 Stdn. unter Rückfluß. Dann tropft man 200 ml Wasser vorsichtig hinzu und trennt die wäßrige Phase ab. Die organische Phase wird zweimal mit Wasser gewaschen und verworfen.
- 5 Die wäßrigen Phasen werden eingeengt, erneut in 200 ml Wasser aufgenommen und mit 3 g Aktiv-Kohle 30 Min. zum Rückfluß erhitzt. Man filtriert, engt zur Trockne ein, versetzt mit Methanol, saugt ab und trocknet im Vakuumexsikkator P_4O_{10} .
- Ausbeute: 23,5 g (48 % d. Th.)

- 10 2-Methyl-1,4-diazabicyclo[3,2,1]octan



- Man löst 23,5 g (0,1 mol) 2-(2-Chlorethyl)-5-methylpiperazin-Dihydrochlorid in 20 ml Wasser und tropft bei maximal 40°C 32 g (0,4 mol) 50%-ige Natronlauge hinzu. Dann rührt man 1 Std. bei 75°C, kühlt, sättigt mit Kaliumcarbonat und extrahiert zehnmal mit je 50 ml
- 15 Dichlormethan. Die organischen Phasen werden über Kaliumcarbonat getrocknet, eingeengt und destilliert.
- Ausbeute: 9,7 g (76,8 % d. Th.)
- Siedepunkt: 60 - 65 °C/0,8 mbar

Beispiel 18



- Analog Beispiel 17 wird 8-Oxa-3-aza-bicyclo[3,2,1]octan-hydrochlorid umgesetzt, wobei 1-Cyclopropyl-6-fluor-1,4-dihydro-7-
- 20

Le A 24 318

(8-oxa-3-aza-bicyclo [3,2,1] oct-3-yl)-4-oxo-3-chinolincarbonsäure vom Schmelzpunkt 272 - 275 °C (unter Zersetzung) (aus Glykolmonomethylether) erhalten wird.

- 5 Das hierfür benötigte 8-Oxa-3-aza-bicyclo [3,2,1] octan-hydrochlorid wird auf folgendem Weg erhalten:

3-Benzyl-8-oxa-3-azabicyclo [3,2,1] octan

61,2 g (0,15 mol) 2,5-Bis-(tosyloxymethyl)-tetrahydrofuran

(F. H. Newth, L. F. Wiggins, J. Chem. Soc. 155 (1948))

- 10 300 ml Toluol und 54 g (0,5 mol) Benzylamin werden 20 Stdn. unter Rückfluß erhitzt. Man filtriert, wäscht mit Toluol, engt ein und destilliert.

Ausbeute : 21,5 g (70,5 % d. Th.)

Siedepunkt: 140 °C/9mbar


8-Oxa-3-azabicyclo [3,2,1] octan-Hydrochlorid

- 15 Man löst 20 g (0,095 mol) 3-Benzyl-8-oxa-3-azabicyclo [3,2,1] octan in 150 ml Methanol und setzt 8,5 ml konzentrierte Salzsäure hinzu. Man hydriert an 5 g Pd-Kohle (10 %ig) bei 50 °C und 50 bar. Der Katalysator wird abgesaugt, die Lösung eingeengt, der Rückstand mit Aceton verrieben, abfiltriert und über P₄O₁₀ getrocknet.

- 20 Ausbeute : 12,5 g (85,3 % d. Th.)

Schmp. : 202 - 204 °C

Beispiel 19



Analog Beispiel 17 wird 3-Oxa-8-aza-bicyclo [3,2,1] octan-hydrochlorid umgesetzt, wobei 1-Cyclopropyl-6-fluor-1,4-dihydro-7-


(3-oxo-8-aza-bicyclo [3,2,1] oct-8-yl)-4-oxo-3-chinolincarbonsäure vom Schmelzpunkt 283 - 284 °C (unter Zersetzung) (aus Glykolmonomethylether) erhalten wird.

5 Das hierfür benötigte 3-Oxa-8-aza-bicyclo [3,2,1] octan wird auf folgendem Weg erhalten:

3-Oxa-8-azabicyclo [3,2,1] octan-Hydrochlorid

Man löst 22,7 g (0,104 mol) 8-Benzyl-3-oxa-8-azabicyclo [3,2,1] -
octan (J. von Braun, J. Seemann, Ber. Deutsch. Chem. Ges. 56,
1840 (1923)) in 140 ml Methanol und setzt 9,3 ml konzentrierte
10 Salzsäure hinzu. Dann hydriert man an 5 g Pd-Kohle (5 %) bei
60 °C und 60 bar. Der Katalysator wird abgesaugt, die Lösung
eingeengt, der Rückstand mit Aceton verrieben, abgesaugt und im
Exsikkator über P₄O₁₀ getrocknet.
Ausbeute: 13,7 g (88,7 % d. Th.)
15 Schmp. : 236 °C


Beispiel 20



Analog Beispiel 17 wird 2,2-Dimethyl-1,4-diazabicyclo [3.2.1]
octan umgesetzt, wobei 1-Cyclopropyl-6-fluor-1,4-dihydro-7-
(2,2-dimethyl-1,4-diazabicyclo [3.2.1] oct-4-yl)-4-oxo-3-chinolin-
carbonsäure vom Schmelzpunkt 242-246 °C (unter Zersetzung) erhalten
20 wird.

Das hierfür benötigte 2,2-Dimethyl-1,4-diazabicyclo [3.2.1] octan
wird auf folgendem Wege erhalten:


5,5-Dimethyl-2-methoxycarbonylmethylpiperazin-3-on



- Man mischt 80 g (0,91 mol) 1,2-Diamino-2-methylpropan, 127 g (0,88 ml) Maleinsäuredimethylester und 200 ml absoluten Ether. Nach der exothermen Reaktion rührt man noch 16 Stunden, saugt ab, engt die Mutterlauge ein und kristallisiert aus Diisopropyl-
 5 ether um.

Ausbeute : 154 g (87 % der Theorie)
 Schmelzpunkt: 76-78 °C

5,5-Dimethyl-2-(2-hydroxyethyl)-piperazin




- 10 Zu einer Suspension von 30,4 g (0,4 mol) LiAlH_4 in 300 ml Tetrahydrofuran tropft man eine heiße Lösung von 80 g (0,4 mol) 5,5-Dimethyl-2-methoxycarbonylmethylpiperazin-3-on in 300 ml Tetrahydrofuran. Anschließend kocht man 16 Stunden unter Rückfluß. Nach Abkühlen zersetzt man überschüssiges LiAlH_4 nacheinander
 15 mit 30 ml Wasser, 30 ml 15 %iger Kalilauge und 30 ml Wasser. Man saugt die anorganischen Salze ab, rührt sie mehrfach mit Dichlormethan aus und trocknet die organischen Phasen über Kaliumcarbonat. Dann wird eingeeengt und destilliert.

- Ausbeute : 31,6 g (49,9 % der Theorie)
 20 Siedepunkt : 114 °C/0,1 mbar

Le A 24 318


2-(2-Chlorethyl)-5,5-dimethylpiperazin-Dihydrochlorid



- 20 g (0,126 mol) 5,5-Dimethyl-2-(2-hydroxyethyl)-piperazin in 100 ml Dichlormethan tropft man zu unter Rückfluß erhitzten 60 g (0,5 mol) Thionylchlorid in 100 ml Dichlormethan. Anschließend rührt man noch 2 Stunden unter Rückfluß. Man hydrolysiert mit 100 ml Wasser und trennt die wäßrige Phase ab. Die organische Phase wird zweimal mit Wasser gewaschen und verworfen. Die wäßrigen Phasen werden zur Trockene eingeengt, in 200 ml Wasser aufgenommen und mit 3 g Aktivkohle 30 Minuten unter Rückfluß erhitzt. Man filtriert, engt ein, wäscht den kristallinen Rückstand mit wenig kaltem Methanol und trocknet im Exsikkator über P_4O_{10} .

Ausbeute: 21 g (66,8 % der Theorie)

2,2-Dimethyl-1,4-diazabicyclo[3.2.1]octan




- Zu 20 g (0,08 mol) 2-(2-Chlorethyl)-5,5-dimethylpiperazin-Dihydrochlorid in 20 ml Wasser tropft man bei maximal 40 °C 30 g 50 %ige Natronlauge. Anschließend erhitzt man noch 1 Stunde auf 80 °C. Dann kühlt man ab, sättigt mit Kaliumcarbonat, extrahiert zehnmal mit je 50 ml Dichlormethan, trocknet über Kaliumcarbonat, engt ein und destilliert.

Ausbeute : 7,9 g (70,5 % der Theorie)


Siedepunkt: 65 °C/4 mbar

Beispiel 21



- 3,37 g (10 mmol) 6,7,8-Trifluor-1-(4-fluor-phenyl)-1,4-dihydro-4-oxo-3-chinolincarbonsäure werden in 30 ml Dimethylsulfoxid mit 2,7 g (24 mmol) 1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octan und 2,1 g (17 mmol) 2-Methyl-1,4-diazabicyclo[3.2.1]octan versetzt und 2 Stunden auf 140°C erhitzt. Das Lösungsmittel wird im Hochvakuum abdestilliert und der Rückstand mit Wasser versetzt (pH 7). Dann wird mit halbkonzentrierter Salzsäure auf pH 1 gestellt, mit dem gleichen Volumen Ethanol versetzt und das Hydrochlorid kalt abgesaugt. Nach Umkristallisation aus Wasser/Ethanol werden 2,5 g 6,8-Difluor-1-(4-fluor-phenyl)-1,4-dihydro-7-(2-methyl-1,4-diazabicyclo[3.2.1]oct-4-yl)-4-oxo-3-chinolincarbonsäure-hydrochlorid vom Schmelzpunkt 325-330°C (Zers.) erhalten.


Beispiel 22



- 3,5 g (10 mmol) 6,7,8-Trifluor-1-(2,4-difluor-phenyl)-1,4-dihydro-4-oxo-3-chinolincarbonsäure werden in 30 ml Dimethylsulfoxid mit 2,7 g (24 mmol) 1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octan und 2,1 g (17 mmol) 2-Methyl-1,4-diazabicyclo[3.2.1]octan

2 Stunden auf 140°C erhitzt. Die Aufarbeitung erfolgt wie in Beispiel 21. Nach Umkristallisation aus Wasser werden 1,1 g 6,8-Difluor-1-(2,4-difluor-phenyl)-1,4-dihydro-7-(2-methyl-1,4-diazabicyclo[3.2.1]oct-4-yl)-4-oxo-3-chinolincarbonsäurehydrochlorid vom Schmelzpunkt 278-280°C (Zers.) erhalten.

Beispiel 23




Analog Beispiel 17 werden 2,9 g (10 mmol) 1-Cyclopropyl-6,7,8-trifluor-1,4-dihydro-4-oxo-3-chinolincarbonsäure umgesetzt. Man erhält 1,5 g 1-Cyclopropyl-6,8-difluor-1,4-dihydro-7-(2-methyl-1,4-diazabicyclo[3.2.1]oct-4-yl)-4-oxo-3-chinolincarbonsäure vom Schmelzpunkt 239-242° (unter Zersetzung) (umkristallisiert aus Glykolmonomethylether).
Massenspektrum: m/e 389 (M+), 325, 276, 247, 111, 97 (98 %), 69, 56 (98 %), 32, 28 (100 %).

Patentansprüche

5

1. 7-(Azabicycloalkyl)-chinoloncarbonsäure- beziehungs-
weise -naphthyridoncarbonsäure-Derivate der Formel
(I)

10



(I),

15

in welcher

20

R¹ für Methyl, Ethyl, Propyl, Isopropyl, Cyclopropyl, Vinyl, 2-Hydroxyethyl, 2-Fluorethyl, Methoxy, Amino, Methylamino, Dimethylamino, Phenyl, Fluorphenyl, 2,4-Difluorphenyl,

25

R² für Wasserstoff, Alkyl mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen, (5-Methyl-2-oxo-1,3-dioxol-4-yl)-methyl,

30

R³ für einen Rest der Formel



35

- in welcher
- 5
- Y für R^4 -N, O, S,
- Z für $-(CH_2)_n-$, $-CH_2-O-CH_2-$, $-CH_2-S-CH_2-$, $-CH_2-S-$,
- 10
$$\begin{array}{c} R^5 \\ | \\ -CH_2-N-CH_2-, \end{array}$$
- n für 1, 2 oder 3,
- 15 R^4 für Wasserstoff, gegebenenfalls durch Hydroxy substituiertes Alkyl, Alkenyl oder Alkynyl mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen, gegebenenfalls durch Nitro oder Amino substituiertes Benzyl, Oxoalkyl mit 2 bis 4 Kohlenstoffatomen oder (5-Methyl-2-
- 20 oxo-1,3-dioxol-4-yl)-methyl und
- R^5 für Wasserstoff oder Methyl steht,
- X^1 für Fluor, Chlor oder Nitro und
- 25 A für N oder $C-R^6$ steht, worin R^6 für Wasserstoff, Fluor, Chlor, Methyl oder Nitro steht oder auch gemeinsam mit R^1 eine Brücke der Struktur
- 30 $-O-CH_2-\underset{|}{CH}-CH_3$, $-S-CH_2-\underset{|}{CH}-CH_3$ oder
- $-CH_2-CH_2-\underset{|}{CH}-CH_3$
- bilden kann,
- 35

mit der Maßgabe, daß für den Fall, daß X^1 für Fluor, R^2 für H und A für CF oder N stehen und R^1 für Ethyl, Cyclopropyl, Fluor-ethyl oder Vinyl steht oder R^6 mit R^1 eine Brücke der Struktur $-O-CH_2-\underset{|}{CH}-CH_3$ bildet, n ungleich 2 ist und R^3 nicht für den


5 Rest

R^4-N  N- stehen kann, sowie ausgenommen die Ver-

bindung 7-(2,5-Diazabicyclo[2.2.2]oct-2-yl)-1-ethyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-chinolincarbonsäure,

10 und deren pharmazeutisch verwendbaren Hydrate und Säureadditionssalze sowie die Alkali-, Erdalkali-, Silber- und Guanidiniumsalze der zugrundeliegenden Carbonsäuren.

2. 7-(Azabicycloalkyl)-chinoloncarbonsäure- beziehungsweise -naphthyridoncarbonsäure-Derivate der Formel (I)



(I),

15 in welcher

R^1 für Methyl, Ethyl, Propyl, Isopropyl, Cyclopropyl, Vinyl, 2-Hydroxyethyl, 2-Fluorethyl, Methoxy, Amino, Methylamino, Dimethylamino, Phenyl, Fluorphenyl, 2,4-Difluorphenyl,

20 R^2 für Wasserstoff, Alkyl mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen, (5-Methyl-2-oxo-1,3-dioxol-4-yl)-methyl,


R^3 für einen im Ringsystem durch Hydroxy oder Methyl ein- oder mehrfach substituierten Rest der Formel



in welcher

Y für R^4-N , O, S,

5 Z für $-(CH_2)_n-$, $-CH_2-O-CH_2-$, $-CH_2-S-CH_2-$, $-CH_2-S-$,





n für 1, 2 oder 3,

10 R^4 für Wasserstoff, gegebenenfalls durch Hydroxy substituiertes Alkyl, Alkenyl oder Alkinyl mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen, gegebenenfalls durch Nitro oder Amino substituiertes Benzyl, Oxoalkyl mit 2 bis 4 Kohlenstoffatomen oder (5-Methyl-2-oxo-1,3-dioxol-4-yl)-methyl und

R^5 für Wasserstoff oder Methyl steht,

X^1 für Fluor, Chlor oder Nitro und

15 A für N oder $C-R^6$ steht, worin R^6 für Wasserstoff, Fluor, Chlor, Methyl oder Nitro steht oder auch gemeinsam mit R^1 eine Brücke der Struktur



bilden kann

5 und deren pharmazeutisch verwendbare Hydrate und Säure-
additionssalze sowie die Alkali-, Erdalkali-, Silber- und
Guanidiniumsalze der zugrundeliegenden Carbonsäuren.

3. 7-(Azabicycloalkyl)-chinoloncarbonsäure- bzw.
-naphthyridoncarbonsäure-Derivate der Formel (I)
10 gemäß Anspruch 1, in denen


R¹ für Methyl, Ethyl, Cyclopropyl, 2-Hydroxyethyl,
Vinyl, 2-Fluorethyl, Methoxy, Methylamino,
Phenyl, 4-Fluorphenyl, 2,4-Difluorphenyl,

R² für Wasserstoff, Methyl, Ethyl,

15 R³ für einen Rest der Formel

0230274

5



in welcher

10

Y für $\text{R}^4\text{-N}$, O,

Z für $-(\text{CH}_2)_n-$, $-\text{CH}_2\text{-O-CH}_2-$, $-\text{CH}_2\overset{\text{R}^5}{\underset{|}{\text{N}}}\text{-CH}_2-$,

15

n für 1, 2 oder 3,

R^4 für Wasserstoff, gegebenenfalls durch Hydroxy substituiertes Alkyl, Alkenyl oder Alkynyl mit 1 bis 3 Kohlenstoffatomen, gegebenenfalls durch Nitro oder Amino substituiertes Benzyl oder Oxoalkyl mit 2 bis 4 Kohlenstoffatomen und

20

R^5 für Wasserstoff oder Methyl steht,

25

X^1 für Fluor, Chlor oder Nitro und

A für N oder C-R^6 steht, worin R^6 für Wasserstoff, Fluor, Chlor, Methyl oder Nitro steht oder auch gemeinsam mit R^1 eine Brücke der Struktur

30



35

bilden kann,

mit der Maßgabe, daß für den Fall, daß X^1 für Fluor, R^2 für H und
 5 A für CF oder N stehen und R^1 für Ethyl, Cyclopropyl, Fluor-
 ethyl oder Vinyl steht oder R^6 mit R^1 eine Brücke der Struktur
 $-O-CH_2-\underset{|}{CH}-CH_3$ bildet, n ungleich 2 ist und R^3 nicht für den
 Rest

10

R^4-N  N- stehen kann, sowie ausgenommen die Ver-

15

bindung 7-(2,5-Diazabicyclo[2.2.2]oct-2-yl)-1-ethyl-
 6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-chinolincarbonsäure,

20

und deren pharmazeutisch verwendbaren Hydrate und
 Säureadditionssalze sowie die Alkali-, Erdalkali-,
 Silber- und Guanidiniumsalze der zugrundeliegenden
 Carbonsäuren.

25

4. 7-(Azabicycloalkyl)-chinoloncarbonsäure- bzw.
 -naphthyridoncarbonsäure-Derivate der Formel (I)
 gemäß Anspruch 1, in der

30

R^1 für Ethyl, Cyclopropyl, 2-Fluorethyl, Methyl-
 amino, Phenyl, 4-Fluorphenyl, 2,4-Difluorphenyl,

R^2 für Wasserstoff, Methyl, Ethyl,

R^3 für einen Rest der Formel

35




- in welcher
- 5
- Y für R^4-N ,
- Z für $-(CH_2)_n-$,
- 10 n für 1 oder 2,
- R^4 für Wasserstoff, gegebenenfalls durch Hydroxy substituiertes Alkyl, Alkenyl oder Alkinyl mit 1 bis 3 Kohlenstoffatomen, gegebenenfalls durch
- 15 Nitro oder Amino substituiertes Benzyl oder Oxoalkyl mit 2 bis 4 Kohlenstoffatomen und
- R^5 für Wasserstoff oder Methyl steht,
- 20 X^1 für Fluor, Chlor oder Nitro und
- A für N oder $C-R^6$ steht, worin
- R^6 für Wasserstoff, Fluor, Chlor oder Nitro steht oder auch gemeinsam mit R^1 eine Brücke der
- 25 Struktur
- $-O-CH_2-\underset{|}{CH}-CH_3$ oder $-CH_2-CH_2-\underset{|}{CH}-CH_3$
- bilden kann,
- 30 mit der Maßgabe, daß für den Fall, daß X^1 für Fluor, R^2 für H und A für CF oder N stehen und R^1 für Ethyl, Cyclopropyl, Fluor-ethyl oder Vinyl steht oder R^6 mit R^1 eine Brücke der Struktur
- $-O-CH_2-\underset{|}{CH}-CH_3$ bildet, n ungleich 2 ist und R^3 nicht für den
- 35 Rest

5 R^4-N  stehen kann, sowie ausgenommen die Ver-

bindung 7-(2,5-Diazabicyclo[2.2.2]oct-2-yl)-1-ethyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-chinolincarbonsäure,

10 und deren pharmazeutisch verwendbaren Hydrate und Säureadditionssalze sowie die Alkali-, Erdalkali-, Silber- und Guanidiniumsalze der zugrundeliegenden Carbonsäuren.

15 5. Verfahren zur Herstellung von 7-(Azabicycloalkyl)-chinoloncarbonsäure- bzw. -naphthyridoncarbonsäure-Derivaten der allgemeinen Formel (I)



(I),

25 in welcher

30 R^1 für Methyl, Ethyl, Propyl, Isopropyl, Cyclopropyl, Vinyl, 2-Hydroxyethyl, 2-Fluorethyl, Methoxy, Amino, Methylamino, Dimethylamino, Phenyl, 4-Fluorphenyl, 2,4-Difluorphenyl,

35 R^2 für Wasserstoff, Alkyl mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen, (5-Methyl-2-oxo-1,3-dioxol-4-yl)-methyl,

R^3 für einen Rest der Formel

5

10




in welcher

15

Y für R^4-N , O, S,

Z für $-(CH_2)_n-$, $-CH_2-O-CH_2-$, $-CH_2-S-CH_2-$, $-CH_2-S-$,

20



n für 1, 2 oder 3,

25

R^4 für Wasserstoff, gegebenenfalls durch Hydroxy substituiertes Alkyl, Alkenyl oder Alkynyl mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen, gegebenenfalls durch Nitro oder Amino substituiertes Benzyl, Oxoalkyl mit 2 bis 4 Kohlenstoffatomen oder (5-Methyl-2-oxo-1,3-dioxol-4-yl)-methyl,


30

R^5 für Wasserstoff oder Methyl steht,

X^1 für Fluor, Chlor oder Nitro und

35

5 A für N oder C-R⁶ steht, worin
 R⁶ für Wasserstoff, Fluor, Chlor, Methyl oder
 Nitro steht oder auch gemeinsam mit R¹ eine
 Brücke der Struktur



bilden kann,


mit der Maßgabe, daß für den Fall, daß X¹ für Fluor, R² für H und
 A für CF oder N stehen und R¹ für Ethyl, Cyclopropyl, Fluor-
 15 ethyl oder Vinyl steht oder R⁶ mit R¹ eine Brücke der Struktur
 $-O-CH_2-\underset{|}{CH}-CH_3$ bildet; n ungleich 2 ist und R³ nicht für den
 Rest

20 R⁴-N  N- stehen kann, sowie ausgenommen die Ver-

bindung 7-(2,5-Diazabicyclo[2.2.2]oct-2-yl)-1-ethyl-
 25 6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-chinolincarbonsäure,

und deren pharmazeutisch verwendbaren Hydraten und
 Säureadditionssalzen sowie deren Alkali-, Erdalkali-,
 Silber- und Guanidiniumsalzen der zugrundeliegenden
 Carbonsäuren,

30 dadurch gekennzeichnet, daß man Verbindungen der
 Formel (II)



(II),

0230274

5 in welcher R^1 , R^2 , X^1 und A die oben angegebene Bedeutung haben und


X^2 für Halogen, insbesondere Fluor oder Chlor, steht,

10 mit Azabicycloalkanen der Formel (III)



15 in welcher R^3 die oben angegebene Bedeutung hat, gegebenenfalls in Gegenwart von Säurebindungsmitteln umgesetzt.

6. Verfahren zur Herstellung von 7-(Azabicycloalkyl)-chinoloncarbonsäure- bzw. -naphthyridoncarbonsäure-Derivaten der allgemeinen Formel (I)



20 in welcher

R^1 für Methyl, Ethyl, Propyl, Isopropyl, Cyclopropyl, Vinyl, 2-Hydroxyethyl, 2-Fluorethyl, Methoxy, Amino, Methylamino, Dimethylamino, Phenyl, Fluorphenyl, 2,4-Difluorphenyl,

25 R^2 für Wasserstoff, Alkyl mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen, (5-Methyl-2-oxo-1,3-dioxol-4-yl)-methyl,


R^3 für einen im Ringsystem durch Hydroxy oder Methyl ein- oder mehrfach substituierten Rest der Formel



in welcher

Y für R^4 -N, O, S,

5 Z für $-(\text{CH}_2)_n-$, $-\text{CH}_2-\text{O}-\text{CH}_2-$, $-\text{CH}_2-\text{S}-\text{CH}_2-$, $-\text{CH}_2-\text{S}-$,



n für 1, 2 oder 3,

10 R^4 für Wasserstoff, gegebenenfalls durch Hydroxy substituiertes Alkyl, Alkenyl oder Alkynyl mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen, gegebenenfalls durch Nitro oder Amino substituiertes Benzyl, Oxoalkyl mit 2 bis 4 Kohlenstoffatomen oder (5-Methyl-2-oxo-1,3-dioxol-4-yl)-methyl und

R^5 für Wasserstoff oder Methyl steht,

X^1 für Fluor, Chlor oder Nitro und

15 A für N oder C- R^6 steht, worin R^6 für Wasserstoff, Fluor, Chlor, Methyl oder Nitro steht oder auch gemeinsam mit R^1 eine Brücke der Struktur


$-O-CH_2-\underset{|}{CH}-CH_3$, $-S-CH_2-\underset{|}{CH}-CH_3$ oder

$-CH_2-CH_2-\underset{|}{CH}-CH_3$

bilden kann

5 und deren pharmazeutisch verwendbare Hydrate und Säure-
additionssalze sowie die Alkali-, Erdalkali-, Silber- und
Guanidiniumsalze der zugrundeliegenden Carbonsäuren,

dadurch gekennzeichnet, daß man Verbindungen der
Formel (II)



(II),

10 in welcher R^1 , R^2 , X^1 und A die oben angegebenen
Bedeutung haben und

X^2 für Halogen, insbesondere Fluor oder Chlor,
steht,


mit Azabicycloalkanen der Formel (III)

R^3-H

(III),

in welcher R^3 die oben angegebene Bedeutung hat, gegebenenfalls in Gegenwart von Säurebindungsmitteln umgesetzt.

- 5 7. Verfahren zur Herstellung von 7-(Azabicycloalkyl)-chinoloncarbonsäure- beziehungsweise -naphthyridoncarbonsäure-Derivaten der allgemeinen Formel (I)




(I),

in welcher


R^1 , R^2 , A und X^1 die in Anspruch 4 angegebene Bedeutung haben und

5 R^3 für einen im Ringsystem gegebenenfalls durch Hydroxy oder Methyl substituierten Rest der Formel



in welcher Z und R^4 die in Anspruch 4 angegebene Bedeutung haben, steht,


15 dadurch gekennzeichnet, daß man eine Verbindung der Formel (IV)



25 in welcher

R^1 , R^2 , A und X^1 die in Anspruch 5 angegebene Bedeutung haben und


30 R^7 für einen Rest der Formel



in welcher

5

Z die oben angegebene Bedeutung hat,
steht, mit Verbindungen der Formel (V)



(V),

10

in welcher

R^4 die oben angegebene Bedeutung hat, aber nicht
für Wasserstoff stehen kann,

15

X^3 für Halogen, insbesondere Chlor, Brom oder Jod,
steht, gegebenenfalls in Gegenwart von Säurebin-
dungsmitteln umgesetzt.


20

8. Verfahren zur Herstellung von 7-(Azabicycloalkyl)-
chinoloncarbonsäure- bzw. -naphthyridoncarbonsäure-
Derivaten der allgemeinen Formel (I) nach Anspruch
4, worin R^4 für $CH_3-CO-CH_2-CH_2-$ steht, durch Umset-
zung einer Verbindung der Formel (IV) in Anspruch 7.
mit Methylvinylketon.

25

9. 7-(Azabicycloalkyl)-chinoloncarbonsäure- beziehungs-
weise -naphthyridoncarbonsäure-Derivate nach Anspruch 2
oder der Formel (I)

30



(I),

35

0230274

in welcher

5

R^1 für Methyl, Ethyl, Propyl, Isopropyl, Cyclopropyl, Vinyl, 2-Hydroxyethyl, 2-Fluorethyl, Methoxy, Amino, Methylamino, Dimethylamino, Phenyl, 4-Fluorphenyl, 2,4-Difluorphenyl,

10

R^2 für Wasserstoff, Alkyl mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen, (5-Methyl-2-oxo-1,3-dioxol-4-yl)-methyl,

15

R^3 für einen Rest der Formel

20




in welcher

25

Y für R^4-N , O, S,

Z für $-(CH_2)_n-$, $-CH_2-O-CH_2-$, $-CH_2-S-CH_2-$, $-CH_2-S-$,

30



n für 1, 2 oder 3,

35



R^4 für Wasserstoff, gegebenenfalls durch Hydroxy substituiertes Alkyl, Alkenyl oder Alkinyl mit

5 1 bis 4 Kohlenstoffatomen, gegebenenfalls durch
Nitro oder Amino substituiertes Benzyl, Oxoalkyl
mit 2 bis 4 Kohlenstoffatomen oder (5-Methyl-2-
oxo-1,3-dioxol-4-yl)-methyl,

10 R^5 für Wasserstoff oder Methyl steht,

X^1 für Fluor, Chlor oder Nitro und

15 A für N oder C- R^6 steht, worin
 R^6 für Wasserstoff, Fluor, Chlor, Methyl oder
Nitro steht oder auch gemeinsam mit R^1 eine
Brücke der Struktur



bilden kann,

mit der Maßgabe, daß für den Fall, daß X^1 für Fluor, R^2 für H und
A für CF oder N stehen und R^1 für Ethyl, Cyclopropyl, Fluor-
25 ethyl oder Vinyl steht oder R^6 mit R^1 eine Brücke der Struktur
 $-O-CH_2-\underset{|}{CH}-CH_3$ bildet, n ungleich 2 ist und R^3 nicht für den
Rest

30 R^4-N  N- stehen kann, sowie ausgenommen die Ver-


bindung 7-(2,5-Diazabicyclo[2.2.2]oct-2-yl)-1-ethyl-
6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-chinolincarbonsäure,

35

0230274

und deren pharmazeutisch verwendbaren Hydrate und
Säureadditionssalze sowie die Alkali-, Erdalkali-,
Silber- und Guanidiniumsalze der zugrundeliegenden
Carbonsäuren, zur Anwendung in einem Verfahren zur
therapeutischen Behandlung des menschlichen oder
tierischen Körpers.

10. Arzneimittel enthaltend Verbindungen nach Anspruch 2
oder 7-(Azabicycloalkyl)-chinoloncarbonsäure- bzw.
naphthyridoncarbonsäure-Derivate der Formel (I)



(I),

in welcher

R¹ für Methyl, Ethyl, Propyl, Isopropyl, Cyclopropyl, Vinyl, 2-Hydroxyethyl, 2-Fluorethyl, Methoxy, Amino, Methylamino, Dimethylamino, Phenyl, 4-Fluorphenyl, 2,4-Difluorphenyl,

R² für Wasserstoff, Alkyl mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen, (5-Methyl-2-oxo-1,3-dioxol-4-yl)-methyl,

R³ für einen Rest der Formel



- in welcher
- 5
- Y für R^4 -N, O, S,
- Z für $-(CH_2)_n-$, $-CH_2-O-CH_2-$, $-CH_2-S-CH_2-$, $-CH_2-S-$,
- 10
- $$\begin{array}{c} R^5 \\ | \\ -CH_2-N-CH_2- \end{array}$$
- n für 1, 2 oder 3,
- 15
- R^4 für Wasserstoff, gegebenenfalls durch Hydroxy substituiertes Alkyl, Alkenyl oder Alkinyl mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen, gegebenenfalls durch Nitro oder Amino substituiertes Benzyl, Oxoalkyl mit 2 bis 4 Kohlenstoffatomen oder (5-Methyl-2-
- 20
- oxo-1,3-dioxol-4-yl)-methyl,
- R^5 für Wasserstoff oder Methyl steht,
- X^1 für Fluor, Chlor oder Nitro und
- 25
- A für N oder C- R^6 steht, worin R^6 für Wasserstoff, Fluor, Chlor, Methyl oder Nitro steht oder auch gemeinsam mit R^1 eine Brücke der Struktur
- 30
- $$\begin{array}{c} -O-CH_2-CH-CH_3, \quad -S-CH_2-CH-CH_3 \text{ oder} \\ | \qquad \qquad \qquad | \\ -CH_2-CH_2-CH-CH_3 \\ | \end{array}$$
- bilden kann,

35


mit der Maßgabe, daß für den Fall, daß X^1 für Fluor, R^2 für H und
 5 A für CF oder N stehen und R^1 für Ethyl, Cyclopropyl, Fluor-
 ethyl oder Vinyl steht oder R^6 mit R^1 eine Brücke der Struktur
 $-O-CH_2-\underset{|}{CH}-CH_3$ bildet, n ungleich 2 ist und R^3 nicht für den
 Rest

10 R^4-N - stehen kann, sowie ausgenommen die Ver-

bindung 7-(2,5-Diazabicyclo[2.2.2]oct-2-yl)-1-ethyl-
 15 6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-chinolincarbonsäure,

und deren pharmazeutisch verwendbaren Hydrate und
 Säureadditionssalze sowie die Alkali-, Erdalkali-,
 Silber- und Guanidiniumsalze der zugrundeliegenden
 20 Carbonsäuren.

11. Verwendung von Verbindungen nach Anspruch 2 oder von
 7-(Azabicycloalkyl)-chinoloncarbonsäure- bzw. naphthyri-
 25 doncarbonsäure-Derivaten der Formel (I)




(I),

in welcher

35 R^1 für Methyl, Ethyl, Propyl, Isopropyl, Cyclopro-
 pyl, Vinyl, 2-Hydroxyethyl, 2-Fluorethyl, Meth-
 oxy, Amino, Methylamino, Dimethylamino, Phenyl,
 4-Fluorphenyl, 2,4-Difluorphenyl,

R^2 für Wasserstoff, Alkyl mit 1 bis 4 Kohlenstoff-
atomen, (5-Methyl-2-oxo-1,3-dioxol-4-yl)-
methyl,


R^3 für einen Rest der Formel



in welcher

Y für R^4 -N, O, S,

Z für $-(CH_2)_n-$, $-CH_2-O-CH_2-$, $-CH_2-S-CH_2-$, $-CH_2-S-$,




n für 1, 2 oder 3,

R^4 für Wasserstoff, gegebenenfalls durch Hydroxy
substituiertes Alkyl, Alkenyl oder Alkinyl mit
1 bis 4 Kohlenstoffatomen, gegebenenfalls durch
Nitro oder Amino substituiertes Benzyl, Oxoalkyl
mit 2 bis 4 Kohlenstoffatomen oder (5-Methyl-2-
oxo-1,3-dioxol-4-yl)-methyl,


- 5 R^5 für Wasserstoff oder Methyl steht,
- X^1 für Fluor, Chlor oder Nitro und
- 10 A für N oder C- R^6 steht, worin
 R^6 für Wasserstoff, Fluor, Chlor, Methyl oder
 Nitro steht oder auch gemeinsam mit R^1 eine
 Brücke der Struktur
 $-O-CH_2-\underset{|}{CH}-CH_3$, $-S-CH_2-\underset{|}{CH}-CH_3$ oder
 15 $-CH_2-CH_2-\underset{|}{CH}-CH_3$
 bilden kann,

mit der Maßgabe, daß für den Fall, daß X^1 für Fluor, R^2 für H und
 A für CF oder N stehen und R^1 für Ethyl, Cyclopropyl, Fluor-
 20 ethyl oder Vinyl steht oder R^6 mit R^1 eine Brücke der Struktur
 $-O-CH_2-\underset{|}{CH}-CH_3$ bildet, n ungleich 2 ist und R^3 nicht für den
 Rest

- 25 R^4-N  N- stehen kann, sowie ausgenommen die Ver-
 bindung 7-(2,5-Diazabicyclo[2.2.2]oct-2-yl)-1-ethyl-
 6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-chinolincarbonsäure,
 30 und deren pharmazeutisch verwendbaren Hydrate und
 Säureadditionssalze sowie die Alkali-, Erdalkali-,
 Silber- und Guanidiniumsalze der zugrundeliegenden
 Carbonsäuren,
 35

zur Herstellung von Arzneimitteln.

12. Tierfutter oder Tierfutterzusätze, enthaltend 7-(Azabicycloalkyl)-chinoloncarbonsäure- beziehungsweise -naphthyridoncarbonsäure-Derivate der Formel (I)



(I),

in welcher

R¹ für Methyl, Ethyl, Propyl, Isopropyl, Cyclopropyl, Vinyl, 2-Hydroxyethyl, 2-Fluorethyl, Methoxy, Amino, Methylamino, Dimethylamino, Phenyl, Fluorphenyl, 2,4-Difluorphenyl,

R² für Wasserstoff, Alkyl mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen, (5-Methyl-2-oxo-1,3-dioxol-4-yl)-methyl,

R³ für einen im Ringsystem gegebenenfalls durch Hydroxy oder Methyl ein- oder mehrfach substituierten Rest der Formel



- in welcher
- 5
- Y für R^4 -N, O, S,
- Z für $-(CH_2)_n-$, $-CH_2-O-CH_2-$, $-CH_2-S-CH_2-$, $-CH_2-S-$,
- 10 $-CH_2-\overset{R^5}{\underset{|}{N}}-CH_2-$,
- n für 1, 2 oder 3,
- 15 R^4 für Wasserstoff, gegebenenfalls durch Hydroxy substituiertes Alkyl, Alkenyl oder Alkinyl mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen, gegebenenfalls durch Nitro oder Amino substituiertes Benzyl, Oxoalkyl mit 2 bis 4 Kohlenstoffatomen oder (5-Methyl-2-
- 20 oxo-1,3-dioxol-4-yl)-methyl und
- R^5 für Wasserstoff oder Methyl steht,
- X^1 für Fluor, Chlor oder Nitro und
- 25 A für N oder C- R^6 steht, worin R^6 für Wasserstoff, Fluor, Chlor, Methyl oder Nitro steht oder auch gemeinsam mit R^1 eine Brücke der Struktur
- 30 $-O-CH_2-\underset{|}{CH}-CH_3$, $-S-CH_2-\underset{|}{CH}-CH_3$ oder
- $-CH_2-CH_2-\underset{|}{CH}-CH_3$
- bilden kann,
- 35

0230274

5 und deren pharmazeutisch v rwendbaren Hydrate und
Säureadditionssalze sowie die Alkali-, Erdalkali-,
Silber- und Guanidiniumsalze der zugrundeliegenden
Carbonsäuren.

10 13. 7-Chlor-1-cyclopropyl-6-fluor-1,4-dihydro-8-nitro-
4-oxo-3-chinolincarbonsäure.

14. 5-Methyl-1,4-diazabicyclo[3.2.1]octan.

15

20

25

30

35

Le A 24 318